

TIEMPOS DE ESPERA RECOMENDADOS PARA FAENA DE GARRAPATICIDAS APROBADOS (BOVINOS)

Principio activo	Vías de administración	Tiempos de espera en carnes después del último tratamiento
Abamectina 1%	Injectable	35 días
Doramectina 1%	Injectable	43 - 59 días
Doramectina 3,15%	Injectable	120 días
Ivermectina 1%	Injectable	35 - 60 días
Ivermectina 1% + Fluazuron 12,5%	Injectable	130 días
Ivermectina 3,15%	Injectable	122 días
Moxidectin	Injectable	35 días
Moxidectin	Pour-on	14 días
Eprinomectina	Pour-on	0 días
Fipronil	Pour-on	100 días
Fipronil + Abamectina	Pour-on	122 días
Flumetrina	Pour-on	5 días
Fluazuron	Pour-on	42 días
Fluzauron + Flumetrina	Pour-on	42 días
Fluralaner 5%	Pour-on	84 días
Alfacipermetrina	Pour-on	2 días
Alfacipermetrina	Baño	2 días
Amitraz	Baño	14 días
Cipermetrina 15%	Baño	2 - 4 días
Ethion 40% + Cipermetrina 10%	Baño	130 días
Clorpirifos 50% +Cipermetrina 20%	Aspersión	70 días

VERIFICAR SIEMPRE LOS TIEMPOS DE ESPERA INDICADOS EN LA ETIQUETA PORQUE ÉSTOS NO SOLO DEPENDEN DEL PRINCIPIO ACTIVO SINO DE LA CONCENTRACIÓN Y/O LOS EXCIPIENTES EN LA FORMULACIÓN Y LA ESPECIE DESTINO



Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Dirección
General de
Servicios Ganaderos

