



CHAQUETA AMARILLA (*Vespula germanica*) un depredador de abejas presente en Sud América aun no encontrado en Uruguay

MGAP - DILAVE - Sección Apicultura
INIA - Apicultura

Agosto 2013

La “chaqueta amarilla” es una avispa cuya zona de origen es Eurasia y norte de África. Actualmente tiene una amplia distribución geográfica. En el cono sur de América, se encuentra en las zonas centrales de Chile desde la década de 1970 y de Argentina desde los 80.

Potencialmente la chaqueta amarilla podría colonizar nuevas áreas hasta llegar a Uruguay. Según la opinión de expertos, este avance se ha visto interrumpido o demorado por las grandes áreas de agricultura que interfieren en la instalación de sus nidos subterráneos.

A fines de otoño los machos y las reinas están en actividad. Las reinas una vez fecundadas hibernan solitarias consumiendo las reservas de sus cuerpos grasos, en primavera se activan



Las obreras de “chaqueta amarilla” miden de 12 a 16 mm de largo, y las reinas hasta 22 mm. Su alimentación varía desde jugos vegetales o secretados por pulgones hasta carroña, y poseen un aguijón liso que no lo pierden al picar.

e inician los nidos. Las obreras son activas en primavera y verano.

Causa daño en un amplio espectro de actividades, tales como la apicultura, la fruticultura, el turismo e incluso la cría de ganado. También puede atacar a las personas en actividades a la intemperie, y en particular donde se acumulan alimentos y/o desperdicios.

*Nido subterráneo
de 8 panales de *Vespula**





Obrera de chaqueta amarilla atacando una obrera de abeja con su aparato bucal masticador.

Actúa como depredador de insectos y en particular ataca a las abejas adultas, las crías y los alimentos almacenados de la colmena.

Esta cartilla tiene como único objetivo informar y advertir a los apicultores ante la eventualidad de observar algún ejemplar cerca de sus colmenas o entrando a una colmena.

Referencias bibliográficas:

D'adamo, P. y otros, 2002, "The potencial distribution of german wasp (*Vespula germanica*)

En las obreras de "chaqueta amarilla", las antenas negras son características y es un elemento para diferenciarlas de otras avispas similares.

in Argentina", New Zealand Journal of Zoology, 29:2, 79-85.

Estay, P. y otros, 2008, "Manejo Integrado de la Avispa Chaqueta amarilla", boletín INIA N° 174, INIA La Platina, Santiago de Chile. Texto y fotos.

Aquellos apicultores que observen cerca de sus colmenas algún insecto de aspecto similar a los que muestran estas fotos, se les solicita que los capturen y remitan a:

DILAVE "MIGUEL C. RUBINO",
Sección Apicultura,
Ruta 8 km 17,
Montevideo.

En caso de no poder capturarlos, por favor comunicarse al 22221063 o 22221078 internos 126 y 165, o a los mails jharriet@mgap.gub.uy o jcamp@mgap.gub.uy.