

***Phyllanthus sellowianus* (Klotzsch) Müll. Arg.**

Nombre común: Sarandí blanco

Hábito: arbusto con una altura no superior a los 4 metros, muy ramificado, formando matorrales que pueden ser muy extensos y estar parcialmente sumergidos. Muy importante para la protección de márgenes de ríos, arroyos y embalses.



Individuos creciendo al margen del Río Negro y detalle de corteza

Hojas: caduco, verde claro y opaco, en ramillas castaño verdosas. Hojas simples, alternas, glabras, discoloras, lanceoladas a elíptico lanceoladas, de 1,5-5 cm de largo por 0,4-1 cm de ancho. Ápice agudo mucronulado, margen entero.



Tallos con hojas simples de disposición alterna

Flores: unisexuales, en inflorescencias fasciculadas axilares. Blanquecino-amarillentas, con corola ausente y cáliz de 5-6 piezas. Las masculinas con pedúnculo más largo que las femeninas.



Detalle de flores en inflorescencias fasciculadas, femeninas (izquierda), masculinas (derecha).

Frutos: cápsula globosa, castaño amarronada al madurar, de 0,25 cm de diámetro, que se disgrega en 6 valvas al madurar.



Frutos en forma de cápsulas, maduros en la base del tallo, inmaduros hacia el ápice.

Fenología: florece entre setiembre y diciembre y fructifica desde noviembre hasta marzo.

Propagación: mediante semillas o estacas. Tiene la misma importancia que el sarandí negro (*Sebastiania schottiana*) para la fijación de márgenes de cursos de agua.

Distribución: característico de América del Sur subtropical, desde el sureste de Brasil, noreste de Argentina, Paraguay y todo Uruguay. Habita en todos los bosques ribereños y pajonales del país, localizándose en las zonas más cercanas a los cursos de agua a modo de matorrales.



Distribución de *Phyllanthus sellowianus* en el país. Fuente: Brussa y Grela, 2007.