

## ***Sebastiania brasiliensis* Spreng.**

**Nombre común:** Blanquillo, Palo de leche

**Hábito:** árbol que puede alcanzar hasta los 8 metros de altura y 30 cm de diámetro. Copa globosa y tronco con corteza grisácea oscura desprendiéndose en escamas. Tiene la característica de ser laticífero.



Detalle de la corteza cubierta de musgos y exudado de látex blanco característico de la especie al dañar el órgano

**Hojas:** simples, alternas, discoloras, papiráceas hasta cartáceas, láminas rómbico lanceoladas a rómbico elípticas, glabras. Muy variables en relación a su tamaño (2,5 a 9 cm de largo por 1,5 a 5 cm de ancho), nervadura central marcada a nivel, ápice agudo, margen dentado crenado, base cuneada, pecíolos cortos (0,5 cm aprox.).



Detalle de hojas simples, alternas.

**Flores:** unisexuales, amarillentas, en inflorescencias espiciformes terminales de 3 a 6 cm de largo, formadas fundamentalmente por flores masculinas sésiles; las femeninas están ubicadas hacia la base de la espiga y en escaso número, con característicos estilos trifidos, largos y destacados.



Flores en inflorescencias espiciformes, terminales.

Fuente: [https://farm4.staticflickr.com/3430/3942711932\\_821918a46e\\_b.jpg](https://farm4.staticflickr.com/3430/3942711932_821918a46e_b.jpg)

**Frutos:** cápsula globosa con seis ángulos, castaño rojiza al madurar, de 1 a 1,2 cm de diámetro que se divide en 3 cocos bivalvos con pocas semillas cada uno.



Frutos en forma de cápsula globosa con 6 ángulos

**Fenología:** florece desde octubre hasta marzo, y fructifica en verano y otoño.

**Propagación:** la cosecha de semillas es difícil, debe hacerse en el comienzo de la maduración de los frutos, antes de que se produzca su dehiscencia. Cosechar el fruto no completamente maduro a principios de verano / otoño. Sembrar en almácigos; riegos normales; repicar en primavera; dos años hasta plantar.

**Distribución:** nativo de América del sur subtropical (Bolivia, Paraguay, centro-sur de Brasil, noreste de Argentina y todo Uruguay. Componente importante de muchos bosques ribereños y de quebrada del país.



Distribución de *Sebastiania brasiliensis* en el país. Fuente: Brussa y Grell, 2007.