



Ministerio
de Salud Pública

Informe epidemiológico

COVID-19

Actualización al 20 de noviembre de 2020



Contenido

Contenido	1
Resumen	2
Glosario	3
Introducción	4
Situación actual.....	4
Caracterización temporal de los casos.....	4
Análisis de tendencia.....	6
Caracterización de los casos	7
Cadenas de transmisión	14
Estimación del número reproductivo de COVID-19 en Uruguay.....	22
Caracterización geográfica de los casos.....	23
Monitoreo de mortalidad.....	23
Intensificación de vigilancia centinela de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	24
Situación actual.....	24
Monitoreo de consultas ambulatorias.....	26
Situación actual.....	26



Resumen

A la fecha se registran 4477 casos confirmados por laboratorio acumulados de COVID-19 en Uruguay:

- El 69% de los casos confirmados a la fecha tiene como antecedente el contacto con un caso confirmado en territorio nacional y el 15% de los casos están vinculados a viajes internacionales. En las últimas semanas se ha registrado un aumento en el número de casos.
- El análisis de casos acumulados a la fecha, muestra que de cada 10 casos, 9 requirieron manejo ambulatorio únicamente y 1 algún tipo de cuidado hospitalario. De cada 100 casos, 2 han requerido ingreso a cuidados intermedios o CTI.
- De los casos confirmados, 459 corresponden a trabajadores de la salud, uno de ellos fallecido.

En cuanto al antecedente de posible exposición en esta población, se identificó una mayor proporción de contactos con un caso confirmado en el ámbito domiciliario, comunitario o con otro trabajador de la salud.

- El análisis de las cadenas de transmisión muestra que se ha logrado la supresión de varias cadenas, incluso aquellas con un número importante de casos.
- Se registraron 33 casos en mujeres embarazadas, actualmente 9 continúan activas.
- El 79,22% de los casos confirmados se consideran recuperados a la fecha.
- La letalidad es de 1,54% y la mortalidad es de 1,95 por 100 mil habitantes. El 91,3% de los fallecidos presentaba comorbilidades y el 81% de ellos pertenecían al grupo de 65 años y más. De los fallecidos, el 68% eran del sexo masculino.
- La gravedad y letalidad es significativamente más alta entre los hombres.
- La probabilidad de requerir ingreso hospitalario se incrementa con la edad: 3 de cada 10 casos en personas de 75 años y más, requirieron ingreso en algún momento.
- No se identifica impacto significativo a nivel hospitalario, en ninguno de los niveles de atención.
- Se han identificado casos en todos los departamentos del país.



Glosario

CIH: Unidad de Control de Infecciones Hospitalarias.

DEVISA: Departamento de Vigilancia en Salud

DLSP: Departamento de Laboratorios de Salud Pública (División Epidemiología, Dirección General de la Salud, Ministerio de Salud Pública).

ELEPEM: establecimiento de larga estadía para personas mayores.

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

ETI: enfermedad tipo Influenza.

FIS: fecha de inicio de síntomas.

IRAG: infección respiratoria aguda grave.

MSP: Ministerio de Salud Pública.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

RIQ: rango intercuartílico.

SG-DEVISA: Sistema Informático de gestión del Departamento de Vigilancia en Salud.

SNIS: Sistema Nacional Integrado de Salud.

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.



Introducción

El presente informe brinda la actualización de la situación epidemiológica nacional en referencia a COVID-19, con la información disponible de las diferentes estrategias de vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en el país.

A la fecha la OMS reporta la ocurrencia de 57.274.018 casos confirmados en todo el mundo, con 1.368.000 defunciones. Se han reportado casos en 190 países¹.

Situación actual

A continuación se presenta la situación epidemiológica de COVID-19 en Uruguay actualizada a la fecha.

Las fuentes de datos utilizadas son el SG-DEVISA, la base de datos de mortalidad de la Unidad de Estadísticas Vitales del MSP, la base de CIH vinculada a plan invierno y centros centinelas de ETI e IRAG y la base de monitoreo de consultas en unidades móviles de DEVISA.

El día 13 de marzo, se realizó la primera confirmación de un caso de COVID-19 en Uruguay. Desde la fecha se han **confirmado por laboratorio 4477 casos** (incidencia acumulada de 126,79 casos por 100.000 habitantes).


Caracterización temporal de los casos

En el gráfico 1 se muestra la curva epidémica según la fecha de inicio de síntomas de los casos confirmados. Se observa inicialmente un brote el 10 de marzo vinculado a un evento social y posteriormente aumentos vinculados a brotes ocurridos en instituciones de salud, ELEPEM y comunitarios. En el gráfico 2 se observa la evolución de casos confirmados acumulados.

¹ World Health Organization. Weekly Operational Update on COVID-19 (20 de noviembre de 2020). Disponible en: <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-operational-update-on-covid-19---20-november-2020>




Gráfico 1. Distribución de casos confirmados de COVID-19, según fecha de inicio de síntomas. Uruguay, 2020 (al 20/11/2020).



Nota: La línea continua corresponde a la media móvil de 5 períodos (días). Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión.

Gráfico 2. Distribución de casos confirmados acumulados de COVID-19, según fecha de inicio de síntomas. Uruguay, 2020 (al 20/11/2020).




Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión.

En relación al antecedente de exposición, la mayoría de los casos presentan antecedente de contacto con casos confirmados (69,0%) o de viaje a una zona de transmisión activa (15,3%). (gráfico 3)



Gráfico 3. Distribución de casos confirmados acumulados de COVID-19, según fecha de inicio de síntomas y antecedente de exposición. Uruguay, 20/11/2020.



Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión.

Análisis de tendencia


Se realizó un análisis de tendencia mediante regresión joinpoint, utilizando el programa informático proporcionado por el Surveillance Research Program del National Cancer Institute de EE.UU.

El modelo de regresión joinpoint, permite identificar el momento en que se producen cambios significativos de la tendencia de una serie, y estima la magnitud del aumento o el descenso observado en cada intervalo o período de tiempo.

Se observan nueve intervalos de tiempo con aumentos y descensos, de los cuales ocho presentan variaciones significativas en la incidencia. La significancia de cada uno de los intervalos se presenta en la tabla 1. El último intervalo muestra un aumento significativo en la incidencia.



Gráfico 4. Análisis de tendencia de mediante regresión Joinpoint de la incidencia de COVID-19. Uruguay 03/03/2020 al 30/10/2020.



Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión.

Tabla 1. Análisis de tendencia de mediante regresión Joinpoint de la incidencia de COVID-19. Uruguay 03/03/2020 al 30/10/2020.

Período	Inicio	Final	Porcentaje de cambio	IC 95%		Test estadístico (t)	Valor p
1	03/03/2020	11/03/2020	73.4*	43.6	109.3	5.8	<0.05
2	11/03/2020	28/03/2020	-6.5*	-12.5	-0.1	-2.0	<0.05
3	28/03/2020	29/05/2020	-1.7*	-2.6	-0.8	-3.9	<0.05
4	29/05/2020	10/06/2020	-14.5*	-23.7	-4.1	-2.7	<0.05
5	10/06/2020	20/06/2020	34.6*	18.7	52.6	4.7	<0.05
6	20/06/2020	29/06/2020	-14.1*	-26.0	-0.2	-2.0	<0.05
7	29/06/2020	18/07/2020	9.5*	5.0	14.1	4.3	<0.05
8	18/07/2020	23/08/2020	-1.5*	-2.8	-0.2	-2.2	<0.05
9	23/08/2020	20/11/2020	2.6*	2.3	3.0	14.6	<0.05

Caracterización de los casos

El 52,42% del total de los casos confirmados son del sexo femenino, siendo la incidencia para este sexo de 129,0 por 100.000 mujeres. La incidencia para el sexo masculino es de 124,3 por 100.000 hombres. La mediana de edad es de 38 años con un RIQ de 25 a 55 años para ambos sexos. En la tabla 2 se observa la incidencia acumulada de la enfermedad para cada grupo de edad. En el gráfico 5 se muestra la distribución de la población según sexo y edad.



Tabla 2. Distribución de casos confirmados de COVID-19 según sexo y grupo de edad. Uruguay, 2020 (al 20/11/2020).

Grupo de edad	Sexo		Sin dato	Total	Incidencia acumulada*
	F	M			
Menor a 15	199	174	0	373	53,70
15 a 24	340	320	0	660	126,26
25 a 34	455	462	0	917	180,01
35 a 44	355	331	0	686	143,26
45 a 54	367	320	0	687	161,52
55 a 64	314	261	0	575	149,47
65 a 74	126	145	0	271	97,54
75 y más	180	103	0	283	119,19
Sin dato	11	12	2	25	NC
Total	2347	2128	2	4477	126,79

* por 100.000 habitantes. NC: no corresponde. F: femenino. M: masculino. Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión.

Gráfico 5. Distribución* de casos confirmados según sexo y edad. Uruguay, 2020 (al 20/11/2020).



*Frecuencia absoluta. Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión.

Del total de casos confirmados, 274 (6,2%) requirieron ingreso hospitalario, 201 de ellos (4,5% del total) a cuidados moderados (sala). Los pacientes que requirieron ingreso en cuidados moderados permanecieron un promedio de 8,5 días, con una mediana de 6,0 y un RIQ de 3,0 a 10,0 días.

Un total de 73 pacientes (1,6% del total de casos confirmados, 26,6% de los que requirieron ingreso hospitalario) requirieron ingreso a UCI. Los pacientes permanecieron ingresados en UCI un promedio de 17,8 días, con una mediana de 11,0




días y un RIQ de 6,0 a 24,5 días. Su distribución por sexo y edad se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Distribución de casos de COVID-19 que requirieron ingreso a cuidados intensivos según sexo y grupo de edad. Uruguay, 2020 (al 20/11/2020).

Grupo de edad	Sexo		Total
	F	M	
Menor a 15	0	0	0
15 a 24	0	0	0
25 a 34	0	0	0
35 a 44	2	3	5
45 a 54	1	7	8
55 a 64	8	12	20
65 a 74	5	18	23
75 y más	7	10	17
Total	23	50	73

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión.

Figura 1. Distribución de casos confirmados según severidad y cuidados requeridos. Uruguay, 2020, al 20/11/2020).




Nota: Leve= casos de manejo ambulatorio; Moderado= ingreso a cuidados moderados; Severo=ingreso a CI/CTI. Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión.



La distribución observada en la Figura 1 coincide con lo reportado internacionalmente, con una distribución de 94% de los casos que requirieron únicamente manejo ambulatorio, 4% que requirieron ingreso hospitalario en cuidados moderados y un 2% de pacientes requirieron ingreso a cuidados intermedios o CTI.

En el gráfico 6 se observa la evolución diaria de los casos ingresados en cuidados moderados y CTI. En el gráfico 7 se muestra el número de casos fallecidos e ingresados en relación con los activos y recuperados.

Gráfico 6. Número de casos confirmados de COVID-19 ingresados en unidades de cuidados intensivos y en cuidados moderados por día. Uruguay, 13 de marzo al 20 de noviembre de 2020.




Fuente: elaborado por DEVISA con datos de relevamiento telefónico diario a instituciones prestadoras integrales de salud.

En el gráfico 8 se observa la evolución diaria de casos activos desde la confirmación del primer caso. A la fecha del presente informe hay 861 casos activos y 11 de ellos se encuentran ingresados en UCI (2,2% de los casos activos). Desde el 13 de marzo hasta la fecha, el promedio de la proporción diaria de casos activos ingresados en UCI fue de 3,1% con una mediana de 2,3% y un RIQ de 1,2% a 4,2%.




Gráfico 7. Número de casos confirmados de COVID-19 activos e ingresados en unidades de cuidados intensivos y en cuidados moderados por día y número de casos recuperados y fallecidos. Uruguay, 13 de marzo al 20 de noviembre de 2020.



Fuente: elaborado por DEVISA con datos del sistema de gestión y de relevamiento telefónico diario a instituciones prestadoras integrales de salud.

Gráfico 8. Número de casos confirmados de COVID-19 activos. Uruguay, 13 de marzo al 20 de noviembre de 2020.




Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión.

En los casos de sexo masculino, la proporción de pacientes que requirieron ingreso y el riesgo de ingreso hospitalario son mayores que en el sexo femenino, con un OR de 1,62 (IC 95% 1,27-2,08) en cualquier área hospitalaria y un OR de 2,44 (IC 95% 1,48-4,01) en UCI. El grupo etario con más proporción de ingresos fue el de 75 años y más,



con un 32,3%. En el gráfico 9 se muestran los casos que requirieron ingreso en comparación con los que fueron tratados en forma ambulatoria según grupo etario.

Gráfico 9. Porcentaje de casos confirmados que requirieron ingreso hospitalario y tratamiento ambulatorio según grupo etario. Uruguay, 2020 (al 20/11/2020).



Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión


Del total de casos confirmados, 1156 (25,82%) se presentaron sin síntomas. Estos casos asintomáticos corresponden en su mayoría a personas que fueron estudiadas por ser contactos de casos confirmados o en el marco de investigaciones de brote o testeos masivos, por muestreo o por protocolos (ELEPEM, asentamientos, laborales, brotes departamentales, testeo para ingreso hospitalario, viajeros que ingresan al país, etc).

En los casos sintomáticos, los síntomas más frecuentes fueron tos, rinorrea, fiebre, odinofagia, anosmia, disgeusia y disnea (gráfico 10). Otros síntomas más severos fueron menos frecuentes, como insuficiencia respiratoria (se presentó en 2,4% de los casos) y neumonía (2,2%). Entre los pacientes internados en cuidados moderados, la disnea se presentó en 47% de los casos y la insuficiencia respiratoria en 29%. En 27% de los casos ingresados en cuidados moderados se presentó neumonía. Entre quienes requirieron ingreso a UCI, la neumonía se presentó en un 47% y la insuficiencia respiratoria en 53%. En el gráfico 11 se muestran los porcentajes de presentación de síntomas en los pacientes ingresados en comparación con el total de casos confirmados.

Hasta la fecha se consideran recuperadas un total de 3547 personas.




Gráfico 10. Distribución de signos y síntomas en casos de COVID-19. Uruguay, 2020 (al 20/11/2020).



Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión

Gráfico 11. Distribución de signos y síntomas en casos confirmados de COVID-19 en el total de casos confirmados, en ingresados en cuidados moderados y en cuidados intensivos. Uruguay, 2020 (al 20/11/2020).




IR: insuficiencia respiratoria. UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión



En 1617 casos (36,12%), los pacientes presentaban comorbilidades, siendo la más frecuente la cardiopatía (15,79% de los casos), seguida por diabetes (5,70% de los casos). Cabe destacar que la cardiopatía incluye la hipertensión arterial. Entre los casos que requirieron internación, el 72,6% presentaban comorbilidades. En el gráfico 12 se muestran los porcentajes de comorbilidad en el total de casos confirmados en comparación con los casos que requirieron ingreso hospitalario.

Gráfico 12. Porcentaje de pacientes con COVID-19 según comorbilidades y requerimiento de asistencia hospitalaria. Uruguay, 2020 (al 20/11/2020).



Cardio: cardiopatía (incluye hipertensión arterial). DM: Diabetes mellitus. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nefro: nefropatía. Neo: neoplasia. Inm Def: inmunodeficiencia. En tabaquismo se incluyen fumadores actuales y ex fumadores. Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión

Cadenas de transmisión


A continuación se muestra el estudio de las cadenas de transmisión actualizadas al 11 de noviembre, las cuales son identificadas mediante la investigación epidemiológica de casos, brotes y el seguimiento de los contactos.

En la Figura 2 se aprecia que actualmente hay cadenas de hasta 12 generaciones. Se destaca que a medida que se avanza en el número de generación de transmisión, la cantidad de casos disminuye.





Figura 2. Cadenas de transmisión identificadas de casos de COVID-19 según generación (generaciones 1ª a 12ª). Uruguay, 2020 (al 11/11/2020).




Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión

Según se muestra en la Figura 3, actualmente existen cadenas de transmisión en la que todos los casos están recuperados.



Figura 3. Cadenas de transmisión identificadas de casos de COVID-19 según estado.
Uruguay, 2020 (al 11/11/2020)



Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión

En cuanto a las poblaciones que se desempeñan en áreas esenciales, se identificaron 459 casos confirmados que corresponden a personal de salud:


- 359 con antecedente de contacto con un caso confirmado
- 34 con antecedente de viaje a zona de circulación
- 66 sin exposición identificada

Del total de casos confirmados en trabajadores de la salud, a la fecha 406 están recuperados, 52 activos y 1 falleció.



Como se aprecia en la Figura 4, el personal de salud frecuentemente genera casos secundarios que pertenecen a esta misma población, mayoritariamente en el ámbito laboral.

Figura 4. Cadenas de transmisión de casos de COVID-19 identificando si corresponden a trabajadores de la salud. Uruguay, 2020 (al 11/11/2020)




Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión

Por otra parte, se identificaron 137 militares, 73 policías, 4 bomberos y 79 funcionarios de residenciales confirmados de COVID-19.

Se registraron 33 casos positivos en embarazadas. En uno de los casos la paciente requirió ingreso hospitalario en cuidados moderados. A la fecha de este informe, 24 de ellas ya se encuentran recuperadas y nueve activas.



Figura 5. Cadenas de transmisión identificadas de casos de COVID-19 según tipo de exposición. Uruguay, 2020 (al 11/11/2020)




Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión

En relación al antecedente epidemiológico de los casos confirmados por laboratorio, como fue mencionado anteriormente, 3094 (69,11%) tienen antecedente de contacto con un caso positivo, 706 (15,77%) tienen antecedente de viaje a zona de transmisión, 677 pacientes (15,12%) no presentan antecedente epidemiológico identificado.




Figura 6. Cadenas de transmisión identificadas de casos de COVID-19 según grupo de edad. Uruguay, 2020 (al 11/11/2020)



Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión



Figura 7. Cadenas de transmisión identificadas de casos de COVID-19 según presencia o no de síntomas. Uruguay, 2020 (al 11/11/2020).




Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión



Estimación del número reproductivo de COVID-19 en Uruguay

Se presenta la estimación diaria del número reproductivo (R_t) y su intervalo de confianza al 95%, calculado con el paquete EpiEstim del software R. El R_t corresponde a la cantidad de casos secundarios generados por cada persona infectada con SARS-CoV-2 para cada día, desde el inicio de la epidemia. Para el cálculo se consideraron los casos originados por transmisión local (se excluyeron los casos con antecedente de viaje a zonas de circulación de COVID-19).

Figura 8. Estimación del número reproductivo (R_t) de COVID-19 en Uruguay. 03/03/2020 al 11/11/2020.



Durante la primera semana de la epidemia se observaron los valores más altos de R_t (el máximo estimado fue 3,8) luego se aprecian aumentos puntuales vinculados fundamentalmente con brotes en instituciones de salud, ELEPEM o comunitarios.

Actualmente el valor de R_t es 0,95.



Caracterización geográfica de los casos

Los 4477 casos confirmados hasta la fecha se distribuyeron en los 19 departamentos. En la tabla 4 se presenta la distribución de los casos confirmados por departamento y la incidencia acumulada.

Tabla 4. Distribución de casos confirmados e incidencia acumulada de COVID-19 según departamento de residencia. Uruguay, 2020 (al 20/11/2020).

Departamento	Casos activos	Casos recuperados	Fallecidos*	Total de casos	Incidencia acumulada**
Artigas	14	49	0	63	85,05
Canelones	139	375	5	519	85,96
Cerro Largo	77	53	1	131	146,16
Colonia	45	100	0	145	110,44
Durazno	0	2	0	2	3,39
Flores	1	8	0	9	33,98
Florida	0	3	0	3	4,33
Lavalleja	1	10	0	11	18,74
Maldonado	29	76	4	109	55,90
Montevideo	466	2110	47	2623	189,64
Paysandú	12	6	0	18	15,01
Río Negro	0	15	0	15	25,73
Rivera	30	480	8	518	475,06
Rocha	7	15	0	22	29,63
Salto	1	24	1	26	19,45
San José	6	64	0	70	59,19
Soriano	10	18	1	29	34,64
Tacuarembó	20	28	0	48	51,67
Treinta y Tres	3	111	2	116	229,77
Total	861	3547	69	4477	126,79

*Se incluye en los fallecidos de Montevideo al ciudadano filipino, tripulante del crucero Greg Mortimer fallecido en ese departamento. En Salto se incluye a un ciudadano brasileiro fallecido en el departamento. En Rivera se incluye un caso que residía en Santa Ana do Livramento pero cursó su enfermedad y falleció en el departamento. ** por 100.000 habitantes. Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión.

Monitoreo de mortalidad

Hasta la fecha de cierre de este informe, fallecieron con diagnóstico de SARS-CoV-2 en el territorio nacional un total de 69 personas, constituyendo una letalidad de 1,54% y una mortalidad en la población general de 1,95 por 100.000 habitantes. La edad de los fallecidos va de 49 a 95 años, con una media de 75,2 años, una mediana de 76 años y un RIQ de 67 a 84 años. La letalidad para el grupo de edad de 65 a 74 años es de 7,38% y para el grupo de 75 años y más es de 12,72%. La letalidad en el sexo femenino es de 0,94% mientras que para los casos de sexo masculino es de 2,21% (OR 2,39 IC 95% 1,43-3,97). La distribución por sexo y edad de los fallecidos se muestra en la tabla 5. De los pacientes fallecidos, 63 presentaban comorbilidades (43 casos presentaron cardiopatía, 20 casos diabetes, 16 casos enfermedad neurológica o neuromuscular, 11



casos obesidad, 10 neoplasia, 6 nefropatía y 5 casos EPOC; inmunodeficiencia y hepatopatía se presentaron en un caso).

Tabla 5. Distribución de casos fallecidos con diagnóstico de SARS-CoV-2 según sexo y grupo de edad. Uruguay, 2020 (al 20/11/2020).

Grupo de edad	Sexo		Total	Letalidad (*)	Mortalidad (**)
	F	M			
Menor a 15	0	0	0	0,00	0,00
15 a 24	0	0	0	0,00	0,00
25 a 34	0	0	0	0,00	0,00
35 a 44	0	0	0	0,00	0,00
45 a 54	1	2	3	0,44	0,71
55 a 64	4	6	10	1,74	2,60
65 a 74	4	16	20	7,38	7,20
75 y más	13	23	36	12,72	15,16
Total	22	47	69	1,54	1,95

* por 100 casos. ** por 100.000 habitantes. *** Un caso corresponde al ciudadano filipino llegado en el crucero Greg Mortimer. Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Gestión.

Intensificación de vigilancia centinela de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)

En Uruguay se lleva a cabo una vigilancia centinela de IRAG y ETI. En el contexto actual, se intensificó esta vigilancia centinela incorporando el estudio de SARS-CoV-2 en las muestras.

Actualmente se cuenta con siete centros centinela (en Montevideo e interior).


Situación actual

A la fecha no se ha detectado un incremento de casos de IRAG respecto a lo esperado en menores de 15 años (gráfico 13). En mayores de 15 años, se detectó un aumento en la tasa a partir de la semana 12 hasta la 18, observándose posteriormente valores dentro de lo esperado (gráfico 14).

De acuerdo al relevamiento diario de las UCI realizado desde DEVISA y del reporte obligatorio de los prestadores de salud al SINAE, no se identifica una ocupación de camas por IRAG mayor al esperado en ninguno de los niveles de cuidados en adultos ni pediatría.




Gráfico 13. Tasa de infección respiratoria aguda grave en menores de 15 años en centros centinela por semana epidemiológica. Uruguay, 2018-2020.



Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias con el reporte de 7 centros centinela de vigilancia de IRAG, 3 en Montevideo y 4 en el interior del país.

Gráfico 14. Tasa de infección respiratoria aguda grave en personas de 15 años y más en centros centinela por semana epidemiológica. Uruguay, 2018-2020.



Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias con el reporte de 7 centros centinela de vigilancia de IRAG, 3 en Montevideo y 4 en el interior del país.



Monitoreo de consultas ambulatorias

En forma semanal se realiza el monitoreo de las consultas ambulatorias por causa respiratoria en emergencias móviles. Las emergencias envían al Departamento de Vigilancia en Salud el número de consultas por esta causa por semana epidemiológica.

Situación actual

El análisis del corredor endémico de consultas ambulatorias en emergencias móviles por infección respiratoria aguda, no evidencia tasas de consultas por encima de lo esperable para la fecha.

