



**Ministerio
de Salud Pública**

Boletín epidemiológico

Semana epidemiológica 52 año 2025

21/12/2025 al 27/12/2025





CONTENIDO

Enfermedades y Eventos de Notificación Obligatoria.....	3
Vías de notificación.....	4
Resumen de eventos.....	5
Brotos.....	7
Arbovirosis.....	8
Enfermedades transmitidas por alimentos.....	10
Hantavirosis.....	11
Hepatitis A.....	13
Hepatitis B.....	15
Hepatitis C.....	17
Leptospirosis.....	19
Meningitis, meningoencefalitis y enfermedad meningocócica.....	21
Parotiditis.....	24
Personas mordidas o con riesgo de exposición a virus rábico.....	27
Sarampión.....	28
Recomendaciones para el equipo de salud.....	33
Recomendaciones para viajeros.....	37
Sífilis.....	39
Tos convulsa.....	40
Varicela.....	43
Conceptos generales de la enfermedad.....	46
Recomendaciones generales.....	48
Infecciones respiratorias.....	50
Vigilancia de IRAG.....	51
Monitoreo de consultas en emergencias móviles.....	55
Informe sobre las variantes COVID-19 bajo vigilancia y su circulación en el país y en la región.....	56
Infecciones asociadas a la atención a la salud.....	62
Brotos de IAAS.....	63



Enfermedades y Eventos de Notificación Obligatoria

El [Código Nacional sobre Enfermedades y Eventos de Notificación Obligatoria](#) establece un sistema de vigilancia nacional que busca garantizar la salud pública mediante la notificación oportuna de eventos de interés sanitario. Se basa en el Decreto 41/2012, que clasifica a los eventos en Grupo A y Grupo B dependiendo del momento en el que se debe realizar la notificación.

El Grupo A, cuya notificación debe realizarse en las primeras 24 horas de sospechado el evento, incluye enfermedades de mayor riesgo para la salud pública que requieren intervenciones inmediatas. El Grupo B incluye enfermedades de menor urgencia, pero cuya vigilancia es fundamental para el monitoreo de los eventos y la evaluación de políticas públicas. Estos eventos deben notificarse en los primeros siete días de la sospecha del caso.

Desde la aprobación del Código en 2012, se han incorporado otros eventos emergentes y reemergentes en concordancia con la situación epidemiológica regional e internacional, como COVID-19, Zika, Chikungunya, Oropuche y M-pox.

La notificación oportuna permite detectar brotes, implementar medidas de control y mitigar el impacto de enfermedades transmisibles y otros eventos de importancia sanitaria.

Están obligados a notificar

- ✓ Médicos, veterinarios, y otros profesionales de la salud, en el ejercicio libre de su profesión o en relación laboral de dependencia.



- ✓ Directores técnicos de hospitales e instituciones de asistencia públicos, privados o de cualquier otro tipo, o quién oficie con tal función.
- ✓ Directores técnicos de laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre.
- ✓ Responsables de internados, comunidades, campamentos y similares.
- ✓ Directores de escuelas, liceos u otros establecimientos de enseñanza públicos o privados.
- ✓ Mandos de establecimientos y dependencias de las Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior, capitanes de buques y pilotos de aeronaves o sus representantes.
- ✓ También podrá notificar una enfermedad o evento cualquier ciudadano que tenga conocimiento o sospecha de la ocurrencia de una enfermedad o circunstancia que pueda significar riesgo para la salud pública.

Vías de notificación

La notificación debe realizarse al Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública por cualquiera de las siguientes vías:

Telefónica: 1934 int. 4010

Correo electrónico: vigilanciaepi@msp.gub.uy

Sistema en línea*: <https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/>

* se requiere registro con usuario. Si aún no tiene usuario puede solicitarlo al correo electrónico vigilanciaepi@msp.gub.uy aclarando su nombre, cédula de identidad, cargo e instituciones en las que trabaja)



Resumen de eventos

Tabla 1. Número de casos e incidencia acumulada de enfermedades de notificación obligatoria del grupo A hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, mediana de últimos 5 años (sin incluir pandémicos) vs 2025.

Evento	N° casos		IA		Diferencia de tasas
	Mediana	2025	Mediana	2025	
Araneismo	0	27	0.00	0.75	0.75
Cólera	0	0	0.00	0.00	0.00
Chikungunya	1	12	0.03	0.33	0.30
Dengue autóctono	0	7	0.00	0.20	0.20
Dengue importado	26	39	0.74	1.09	0.35
Difteria	0	0	0.00	0.00	0.00
Enfermedad meningocócica*	29	40	0.81	1.11	0.30
Enfermedad transmitida por alimentos	386	524	10.97	14.60	3.63
Fiebre amarilla	0	0	0.00	0.00	0.00
Hantavirus	16	10	0.45	0.28	-0.17
Meningitis aguda bacteriana**	61	67	1.73	1.87	0.14
Meningitis/meningoencefalitis viral	41	35	1.17	0.98	-0.19
M-pox	0	0	0.00	0.00	0.00
Ofidismo	6	33	0.17	0.92	0.75
Oropuche***	0	3	0.00	0.08	0.08
Personas mordidas o con riesgo de exposición a virus rábico	2781	4829	77.97	134.55	56.58
Parálisis flácida aguda	0	0	0.00	0.00	0.00
Poliomielitis	0	0	0.00	0.00	0.00
Rubéola	0	0	0.00	0.00	0.00
Sarampión***	0	13	0.00	0.36	0.36
Síndrome de rubéola congénita	0	0	0.00	0.00	0.00
Tétanos	0	0	0.00	0.00	0.00
Tétanos neonatal	0	0	0.00	0.00	0.00
Tos convulsa	7	17	0.20	0.47	0.27
Viruela	0	0	0.00	0.00	0.00

* Incluye enfermedad meningocócica y meningitis/encefalitis por *N. meningitidis*. ** No incluye meningitis a meningococo ni enfermedad por *N.meningitidis*. *** 5 casos importados y 8 sin antecedente de viaje.

IA: incidencia acumulada por 100.000 habitantes. † Casos importados de Cuba y Brasil.

¹ Para las Enfermedades transmitidas por alimentos se considera la incidencia de casos notificados.

Los años incluidos en la mediana son 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024



Fuente: sistema informático SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

Tabla 2. Número de casos e incidencia acumulada de enfermedades de notificación obligatoria del grupo B hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, mediana de últimos 5 años (sin incluir pandémicos) vs 2025.

Evento	Nº casos		IA		Diferencia de tasas
	Mediana	2025	Mediana	2025	
Brucelosis	4	1	0.11	0.03	-0.08
Carbunco	0	0	0.00	0.00	0.00
Chagas agudo	0	0	0.00	0.00	0.00
Chagas congénito	1	0	0.03	0.00	-0.03
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob	0	0	0.00	0.00	0.00
Fiebre Q	1	1	0.03	0.03	0.00
Fiebre tifoidea	0	0	0.00	0.00	0.00
Hepatitis A	11	11	0.31	0.31	0.00
Hepatitis B	384	140	10.80	3.90	-6.90
Hepatitis C	307	193	8.61	5.38	-3.23
Hepatitis E	2	10	0.06	0.28	0.22
Hidatidosis	2	0	0.06	0.00	-0.06
Leishmaniasis tegumentaria	0	0	0.00	0.00	0.00
Leishmaniasis visceral	1	0	0.03	0.00	-0.03
Leptospirosis	69	65	1.97	1.81	-0.16
Malaria	13	5	0.37	0.14	-0.23
Parotiditis infecciosa	357	307	10.18	8.55	-1.63
Sífilis	6571	5604	184.84	156.15	-28.69
Varicela	449	875	12.55	24.38	11.83

IA: incidencia acumulada de casos confirmados por 100.000 habitantes (*) En el caso de Hepatitis B, Hepatitis C, Varicela y sífilis se considera la incidencia de casos notificados, se calculó la incidencia de notificaciones, Los años incluidos en la mediana son 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024. Fuente: sistema informático SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.



Brotos

Tabla 3. Número de brotes registrados y de personas afectadas según evento. Uruguay, 2025 (hasta la semana epidemiológica 52).

Evento	Número de brotes	Número de personas afectadas
COVID-19	4	29
Dengue/Zika/Chikungunya	2	6
Enfermedad transmitida por alimentos	30	337
Escabiosis	15	136
Escarlatina	49	212
GEA	41	686
Influenza A	1	6
IRA	23	460
Mano pie boca	81	747
Molusco contagioso	1	5
Mononucleosis	2	5
Oxiuriasis	1	2
Parotiditis infecciosa	3	6
Psitacosis	3	6
<i>S. pyogenes</i>	1	10
Sarampión	1	12
Tos convulsa	1	2
Varicela	99	377

GEA: gastroenteritis aguda. IRA: infección respiratoria aguda. Fuente: sistema informático SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.



Arbovirosis

Tabla 4. Número de casos confirmados e incidencia acumulada de dengue por departamento hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.

Departamento	2024						2025						Diferencia de tasas
	Casos sin AV	IA	Casos con AV	IA	Total de casos	IA	Casos sin AV	IA	Casos con AV	IA	Total de casos	IA	
Artigas	27	36.97	5	6.85	32	43.81	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-43.81
Canelones	12	1.90	57	9.01	69	10.90	0	0.00	4	0.62	4	0.62	-10.28
Cerro Largo	0	0.00	1	1.12	1	1.12	0	0.00	1	1.12	1	1.12	0.00
Colonia	3	2.26	24	18.06	27	20.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-20.31
Durazno	5	8.48	2	3.39	7	11.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-11.88
Flores	0	0.00	2	7.56	2	7.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-7.56
Florida	1	1.44	5	7.21	6	8.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-8.65
Lavalleja	0	0.00	6	10.32	6	10.32	0	0.00	1	1.72	1	1.72	-8.60
Maldonado	5	2.44	61	29.83	66	32.27	0	0.00	10	4.84	10	4.84	-27.44
Montevideo	79	5.71	178	12.86	257	18.57	2	0.14	21	1.52	23	1.66	-16.90
Paysandú	222	183.90	21	17.40	243	201.30	4	3.31	0	0.00	4	3.31	-197.99
Río Negro	4	6.77	7	11.85	11	18.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-18.62
Rivera	26	23.67	9	8.19	35	31.87	1	0.91	0	0.00	1	0.91	-30.96
Rocha	0	0.00	15	20.12	15	20.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-20.12
Salto	309	228.41	19	14.04	328	242.46	0	0.00	1	0.74	1	0.74	-241.72
San José	16	13.13	7	5.75	23	18.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-18.88
Soriano	2	2.40	6	7.21	8	9.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-9.61
Tacuarembó	1	1.08	1	1.08	2	2.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-2.16
Treinta y Tres	0	0.00	1	1.98	1	1.98	0	0.00	1	1.98	1	1.98	0.00
Total	712	19.90	427	11.93	1139	31.83	7	0.20	39	1.09	46	1.28	-30.55

AV: antecedente de viaje. IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: sistema informático SG-DEVISA.


Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

En el año 2024 se registró un aumento de casos de dengue, inicialmente importado y más tarde autóctono, entre las semanas epidemiológicas 1 y 20. La situación actual representa una franca disminución en las tasas, coincidiendo con



la situación regional de la enfermedad. En la región de las Américas, hasta la semana epidemiológica 40 de 2025, se registró una disminución de casos del 68% con respecto al mismo período de 2024 y de 9% con respecto al promedio de los últimos 5 años.¹

Gráfico 1. Curva epidémica de dengue. Desde semana epidemiológica 1 de 2024 hasta semana epidemiológica 52, 2025. Uruguay.



Fuente: sistema informático SG-DEVISA.

¹ Organización Panamericana de la Salud. Situación epidemiológica del dengue en las Américas - Semana epidemiológica 40, 2025. Disponible en: [Situación epidemiológica del dengue en las Américas - Semana epidemiológica 40](#).



Enfermedades transmitidas por alimentos

Hasta la SE 52 se han notificado 524 casos de ETA, de los cuales 337 corresponden a brotes que se detallan en la tabla 5.

Tabla 5. Número de brotes y personas afectadas por enfermedad transmitida por alimentos por departamento de la SE 1 a la 52 Uruguay, 2025.

Departamento	Número de brotes	Número de personas afectadas
Canelones	5	50
Durazno	1	6
Flores	1	4
Maldonado	5	47
Montevideo	17	219
Rivera	1	11
Total	30	337

Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

Los casos de ETA reportados hasta la SE 52 presentan un promedio de edad de 32,6 años. El 53,6 % de los casos corresponden al sexo masculino.



Hantavirus

Tabla 6. Número de casos confirmados, número de fallecidos e incidencia acumulada de hantavirus por departamento hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.

Departamento	Casos 2024	Casos 2025	IA 2024	IA 2025	Diferencia IA	Fallecidos 2024	Fallecidos 2025
Artigas	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
Canelones	1	2	0.16	0.31	0.15	0	0
Cerro Largo	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
Colonia	4	0	3.01	0.00	-3.01	1	0
Durazno	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
Flores	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
Florida	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
Lavalleja	1	1	1.72	1.72	0.00	0	0
Maldonado	3	0	1.47	0.00	-1.47	0	0
Montevideo	5	2	0.36	0.14	-0.22	0	0
Paysandú	2	0	1.66	0.00	-1.66	0	0
Río Negro	1	1	1.69	1.69	0.00	0	0
Rivera	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
Rocha	1	1	1.34	1.34	0.00	0	0
Salto	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
San José	1	0	0.82	0.00	-0.82	0	0
Soriano	2	3	2.40	3.61	1.21	0	1
Tacuarembó	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
Treinta y Tres	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
Total	21	10	0.59	0.28	-0.31	1	1

IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.



En 2025, hasta la SE 52, los casos de hantaviriosis registrados corresponden a adultos de entre 26 y 75 años de edad: ocho hombres y dos mujeres. Cinco de los casos requirieron internación en CTI y uno de ellos falleció.



Hepatitis A

Tabla 7. Número de casos notificados e incidencia acumulada de hepatitis A por departamento a la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.

Departamento	Casos 2024	Casos 2025	IA 2024	IA 2025	Diferencia IA
Artigas	0	0	0.00	0.00	0.00
Canelones	6	1	0.95	0.16	-0.79
Cerro Largo	0	0	0.00	0.00	0.00
Colonia	0	0	0.00	0.00	0.00
Durazno	0	0	0.00	0.00	0.00
Flores	0	0	0.00	0.00	0.00
Florida	0	0	0.00	0.00	0.00
Lavalleja	0	0	0.00	0.00	0.00
Maldonado	0	0	0.00	0.00	0.00
Montevideo	30	8	2.17	0.58	-1.59
Paysandú	0	0	0.00	0.00	0.00
Río Negro	0	0	0.00	0.00	0.00
Rivera	0	0	0.00	0.00	0.00
Rocha	0	0	0.00	0.00	0.00
Salto	0	0	0.00	0.00	0.00
San José	2	1	1.64	0.82	-0.83
Soriano	1	1	1.20	1.20	0.00
Tacuarembó	0	0	0.00	0.00	0.00
Treinta y Tres	0	0	0.00	0.00	0.00
Total	39	11	1.09	0.31	-0.78

IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.



En 2025, hasta la SE 52, los casos de hepatitis A registrados corresponden a adultos de entre 19 y 70 años de edad: ocho hombres y tres mujeres. Seis casos requirieron internación en cuidados moderados, todos con buena evolución.



Hepatitis B

Tabla 8. Número de casos confirmados y en investigación e incidencia acumulada por departamento de hepatitis B a la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.

Departamento	Casos 2024	Casos 2025	IA 2024	IA 2025	Diferencia IA
Artigas	2	1	2.74	1.37	-1.36
Canelones	17	10	2.69	1.56	-1.12
Cerro Largo	1	1	1.12	1.12	0.00
Colonia	2	2	1.50	1.50	0.00
Durazno	1	1	1.70	1.70	0.00
Flores	2	1	7.56	3.78	-3.78
Florida	1	1	1.44	1.44	0.00
Lavalleja	2	6	3.44	10.34	6.90
Maldonado	18	18	8.80	8.70	-0.10
Montevideo	111	79	8.02	5.71	-2.31
Paysandú	0	1	0.00	0.83	0.83
Río Negro	0	0	0.00	0.00	0.00
Rivera	1	3	0.91	2.73	1.82
Rocha	4	5	5.37	6.70	1.33
Salto	3	5	2.22	3.69	1.47
San José	3	3	2.46	2.45	-0.02
Soriano	0	0	0.00	0.00	0.00
Tacuarembó	1	0	1.08	0.00	-1.08
Treinta y Tres	1	3	1.98	5.95	3.97
Total	170	140	4.75	3.90	-0.85

IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.



En 2025, hasta la SE 52, los casos de hepatitis B registrados corresponden a adultos de entre 18 y 87 años de edad, con un promedio de 45,7 años. El 50,7% de los casos corresponde a mujeres y el 49,3% a hombres. Once casos requirieron internación, nueve con buena evolución, mientras que los otros dos casos fallecieron.



Hepatitis C

Tabla 9. Número de casos confirmados y en investigación e incidencia acumulada por departamento de hepatitis C a la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.

Departamento	Casos 2024	Casos 2025	IA 2024	IA 2025	Diferencia IA
Artigas	1	1	1.37	1.37	0.01
Canelones	25	20	3.95	3.12	-0.83
Cerro Largo	4	1	4.46	1.12	-3.35
Colonia	2	1	1.50	0.75	-0.75
Durazno	0	1	0.00	1.70	1.70
Flores	0	0	0.00	0.00	0.00
Florida	1	0	1.44	0.00	-1.44
Lavalleja	3	2	5.16	3.45	-1.71
Maldonado	21	16	10.27	7.74	-2.53
Montevideo	152	123	10.98	8.89	-2.09
Paysandú	1	5	0.83	4.14	3.31
Río Negro	1	0	1.69	0.00	-1.69
Rivera	2	2	1.82	1.82	0.00
Rocha	7	5	9.39	6.70	-2.69
Salto	1	1	0.74	0.74	0.00
San José	2	5	1.64	4.08	2.43
Soriano	2	1	2.40	1.20	-1.20
Tacuarembó	1	5	1.08	5.40	4.32
Treinta y Tres	3	4	5.95	7.93	1.98
Total	229	193	6.40	5.38	-1.02

IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.



En 2025, hasta la SE 52, los casos de hepatitis C registrados corresponden a adultos de entre 16 y 85 años de edad, con un promedio de 45,4 años. El 59,6% son de sexo masculino.



Leptospirosis

Tabla 10. Número de casos confirmados, número de fallecidos e incidencia acumulada de leptospirosis hasta la semana epidemiológica 52 por departamento. Uruguay, 2024-2025.

Departamento	Casos 2024	Casos 2025	IA 2024	IA 2025	Diferencia IA	Fallecidos 2024	Fallecidos 2025
Artigas	2	0	2.74	0.00	-2.74	0	0
Canelones	6	3	0.95	0.47	-0.48	0	0
Cerro Largo	5	2	5.58	2.23	-3.35	1	0
Colonia	10	10	7.52	7.50	-0.02	0	0
Durazno	3	3	5.09	5.09	0.00	0	0
Flores	2	0	7.56	0.00	-7.56	0	0
Florida	10	4	14.42	5.77	-8.65	0	0
Lavalleja	1	0	1.72	0.00	-1.72	0	0
Maldonado	2	0	0.98	0.00	-0.98	0	0
Montevideo	20	7	1.44	0.51	-0.94	2	1
Paysandú	3	3	2.49	2.48	0.00	0	0
Río Negro	4	4	6.77	6.75	-0.02	0	0
Rivera	2	2	1.82	1.82	0.00	0	0
Rocha	4	4	5.37	5.36	-0.01	0	0
Salto	5	2	3.70	1.47	-2.22	0	0
San José	8	10	6.57	8.15	1.58	0	1*
Soriano	3	5	3.60	6.01	2.41	0	0
Tacuarembó	2	2	2.16	2.16	0.00	0	0
Treinta y Tres	1	4	1.98	7.93	5.95	0	0
Total	93	65	2.60	1.81	-0.79	3	2


IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro. *Leptospirosis no fue la causa determinante del fallecimiento

En 2025, hasta la SE 52, los casos de leptospirosis registrados presentan un promedio de edad de 42,2 años, con un rango de entre 14 y 83 años. El 95,4 % de



los casos corresponde a hombres. Requirieron internación 40 casos, dos de ellos fallecieron (en un caso la leptospirosis no fue la causa determinante de la defunción).

Gráfico 2. Corredor endémico leptospirosis. Uruguay, 2025.



Fuente: SG-DEVISA.



Meningitis, meningoencefalitis y enfermedad meningocócica

Tabla 11. Número de casos, incidencia acumulada y número de fallecidos por meningitis, meningoencefalitis y enfermedad meningocócica hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.

Evento		N° casos		IA		N° fallecidos		Diferencia IA
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	
Meningitis y enfermedad meningocócica		48	40	1.34	1.11	11	5	-0.23
Meningitis bacteriana	Meningitis por <i>H. influenzae</i>	7	8	0.20	0.22	0	0	0.03
	Meningitis por <i>S. pneumoniae</i>	35	24	0.98	0.67	10	7	-0.31
	Meningitis por <i>Listeria monocytogenes</i>	2	5	0.06	0.14	1	3	0.08
	Microorganismo sin identificar	13	18	0.36	0.50	1	3	0.14
	Otro microorganismo identificado (no incluye <i>N. meningitidis</i>)	10	12	0.28	0.33	5	1	0.05
Meningitis y meningoencefa litis virales	Enterovirus	61	4	1.70	0.11	0	0	-1.59
	Herpes simplex 1 y 2	15	9	0.42	0.25	2	2	-0.17
	<i>Herpes zoster</i>	1	17	0.03	0.47	0	3	0.45
	EEO	4	0	0.11	0.00	2	0	-0.11
	Otras virales	12	7	0.34	0.20	1	1	-0.14

IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

Tal como se observa en la tabla 11, la incidencia acumulada de meningitis y enfermedad meningocócica hasta la SE 52 de 2025 es menor a la registrada en igual período de 2024.

Un comportamiento similar se observa en los casos de meningitis por *Streptococcus pneumoniae*, cuya incidencia disminuyó de 0,98 a 0,67 cada 100.000 habitantes.



Respecto a las meningitis y meningoencefalitis virales, se observa un aumento en la incidencia de casos debidos a Herpes zoster.

Tabla 12. Número de casos de meningitis y enfermedad meningocócica por grupo etario y serogrupo. Uruguay, 2025.

Grupo etario	Serogrupo			
	B	C	W135	Sin identificar
Menor de un año	0	0	4	1
De 1 a 4 años	1	1	0	3
De 5 a 14 años	2	2	0	3
De 15 a 64 años	2	11	3	5
De 65 años y más	0	0	1	1
Total	5	14	8	13

Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

Tabla 13. Número de casos de meningitis y enfermedad meningocócica por departamento. Uruguay, 2025.

Departamento	Casos 2025	IA 2025	Fallecidos 2025
Canelones	8	1.25	2
Cerro Largo	1	1.12	0
Colonia	1	0.75	0
Maldonado	5	2.42	1
Montevideo	16	1.16	1
Paysandú	4	3.31	0
Rivera	3	2.73	0
Salto	1	0.74	0
Soriano	1	1.20	1
Total	40	1.11	5



IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

Tabla 14. Número de casos, incidencia acumulada, número de fallecidos y letalidad de meningitis por *S. pneumoniae* por grupo etario. Uruguay, 2025.

Grupo etario	Nº casos	IA	Nº fallecidos	Letalidad
Menor de un año	2	4.54	1	50.00
De 1 a 4 años	0	0.00	0	0.00
De 5 a 14 años	2	0.44	0	0.00
De 15 a 64 años	10	0.43	1	10.00
De 65 años y más	10	1.78	6	60.00
Total	24	0.67	8	33.33



Parotiditis

Tabla 15. Número de casos e incidencia acumulada de parotiditis infecciosa por rango etario hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.

Rango etario	Casos 2024	Casos 2025	IA 2024	IA 2025	Diferencia IA
Menor de 1 año	1	4	2.26	9.09	6.83
De 1 a 4 años	71	75	39.71	42.13	2.42
De 5 a 9 años	121	89	53.24	39.30	-13.93
De 10 a 14 años	88	30	37.99	13.01	-24.98
De 15 a 19 años	19	7	7.94	2.96	-4.99
De 20 a 24 años	11	9	4.30	3.56	-0.74
De 25 a 29 años	12	8	4.44	2.99	-1.46
De 30 a 34 años	17	15	6.63	5.77	-0.86
De 35 a 39 años	9	8	3.68	3.24	-0.44
De 40 a 44 años	15	10	6.37	4.25	-2.12
De 45 a 49 años	11	9	4.61	3.76	-0.85
De 50 a 54 años	7	8	3.25	3.66	0.40
De 55 a 59 años	11	5	5.61	2.53	-3.08
De 60 a 64 años	8	7	4.17	3.64	-0.53
De 65 a 69 años	6	8	3.55	4.66	1.11
De 70 a 74 años	6	6	4.49	4.36	-0.12
De 75 y más	8	9	3.20	3.55	0.35
TOTAL	421	307	11.77	8.55	-3.21

IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.



Tabla 16. Número de casos e incidencia acumulada de parotiditis infecciosa por departamento hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.

Departamento	Casos 2024	Casos 2025	IA 2024	IA 2025	Diferencia IA
Artigas	3	3	4.11	4.12	0.02
Canelones	29	24	4.58	3.75	-0.83
Cerro Largo	6	5	6.69	5.58	-1.12
Colonia	66	24	49.66	18.01	-31.65
Durazno	0	1	0.00	1.70	1.70
Flores	2	3	7.56	11.34	3.78
Florida	23	3	33.18	4.33	-28.85
Lavalleja	3	1	5.16	1.72	-3.44
Maldonado	8	10	3.91	4.84	0.92
Montevideo	131	104	9.46	7.51	-1.95
Paysandú	25	36	20.71	29.78	9.07
Río Negro	3	4	5.08	6.75	1.67
Rivera	0	3	0.00	2.73	2.73
Rocha	0	3	0.00	4.02	4.02
Salto	82	56	60.61	41.29	-19.32
San José	11	4	9.03	3.26	-5.77
Soriano	25	16	30.03	19.24	-10.78
Tacuarembó	4	6	4.32	6.48	2.16
Treinta y Tres	0	1	0.00	1.98	1.98
Total	421	307	11.77	8.55	-3.21

IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

El análisis de los casos de parotiditis muestra una disminución en la incidencia acumulada a la SE 52 al comparar con 2024 y también respecto a la mediana de los últimos 5 años (sin incluir pandémicos). La mayor disminución se encuentra en el




rango etario de entre 5 y 14 años, mientras que para menores de 1 año la tasa está aumentada.

A nivel departamental, Colonia, Florida y Salto presentan la mayor disminución en la incidencia acumulada a la SE 52, mientras que Flores, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Durazno, Tacuarembó y Treinta y Tres presentan un aumento de incidencia con respecto al año anterior.

El corredor endémico acumulado de parotiditis muestra que la incidencia acumulada pasó de la zona de alerta a la zona de seguridad.

Gráfico 3. Corredor endémico parotiditis infecciosa. Uruguay, 2025.



Fuente: SG-DEVISA.



Personas mordidas o con riesgo de exposición a virus rábico

Tabla 17. Número de casos por departamento y animal involucrado hasta la semana epidemiológica 52, Uruguay, 2025.

Departamento	Perro	Murciélago	Gato	Otro	Total
Artigas	63	2	0	0	65
Canelones	492	4	36	5	537
Cerro Largo	54	1	14	1	70
Colonia	290	1	25	0	316
Durazno	79	0	5	2	86
Flores	72	1	4	0	77
Florida	20	0	3	0	23
Lavalleja	92	0	8	1	101
Maldonado	200	7	26	2	235
Montevideo	1177	33	112	12	1334
Paysandú	296	2	27	0	325
Río Negro	64	0	3	0	67
Rivera	384	1	28	1	414
Rocha	32	2	0	0	34
Salto	465	0	42	1	508
San José	164	2	13	0	179
Soriano	119	0	7	0	126
Tacuarembó	303	0	14	2	319
Treinta y Tres	13	0	0	0	13
Total	4379	56	367	27	4829

Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

En 1535 casos se realizó recomendación de vacuna antirrábica y en 77 de esos casos también la administración de inmunoglobulina en cumplimiento de las indicaciones del [protocolo de manejo de personas mordidas o con exposición a virus rábico](#).



Sarampión

En el año 2024 no se registraron casos de sarampión en Uruguay. En la semana epidemiológica 5 del año 2025 se registró un caso confirmado en una persona adulta de nacionalidad extranjera, con antecedente de viaje a Argentina y sin antecedentes de vacunación contra la enfermedad. Desde la SE 47 se encuentra en curso una investigación epidemiológica por un brote de sarampión en una zona próxima a la localidad de San Javier, departamento de Río Negro. Se trata de un brote intrafamiliar con 6 casos confirmados, epidemiológicamente relacionados con un viaje a Bolivia realizado por la familia, con regreso a Uruguay el 16 de noviembre. Los casos corresponden a dos mujeres y cuatro hombres, con un rango de edad de 11 a 46 años, ninguno de ellos vacunado contra sarampión. Posteriormente, se identificó un caso de sarampión de transmisión local en una persona adulta con nexo epidemiológico directo con los viajeros. También se registraron 5 casos confirmados en adultos residentes en la ciudad de Fray Bentos, todos vinculados al mismo brote.

Tras la detección del primer caso sospechoso, el MSP activó de inmediato las acciones previstas en el protocolo, en coordinación con los prestadores de salud de la zona, las direcciones departamentales de Río Negro y Paysandú, y los centros educativos de la zona.

Los equipos continúan trabajando en territorio con presencia permanente, realizando búsqueda activa de personas con síntomas compatibles, verificando el



estado vacunal de niños y adultos, fortaleciendo la capacitación de los equipos de salud y facilitando el acceso a la vacunación.

Contexto global y regional

El pasado 10 de noviembre de 2025 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizó un llamado a la acción regional tras la pérdida del estatus de eliminación del sarampión en las Américas.²

Al 7 de noviembre de 2025, se han notificado 12.596 casos confirmados de sarampión en diez países (aproximadamente el 95% de los casos de la región se concentran en Canadá, México y Estados Unidos), lo que supone un aumento de 30 veces en comparación con 2024. Además, se han registrado 28 defunciones: 23 en México, tres en Estados Unidos y dos en Canadá.

La transmisión ha afectado principalmente a comunidades con baja cobertura de vacunación; el 89% de los casos corresponde a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido. Los niños menores de 1 año son el grupo más afectado, seguidos por los de 1 a 4 años.

2

<https://www.paho.org/es/noticias/10-11-2025-ops-hace-llamado-accion-regional-tras-perdi-da-estatus-eliminacion-sarampion>



Vigilancia de sarampión

Se recuerda al equipo de salud

El sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria del grupo A (primeras 24 horas de sospechada la enfermedad) según Decreto N° 41/012.

Definiciones de caso

- **Caso sospechoso:** toda persona que presenta fiebre y exantema máculo-papular, acompañado o no por una o más de las siguientes manifestaciones: tos, rinitis, conjuntivitis.
- **Caso confirmado:** caso sospechoso confirmado por laboratorio o por nexo epidemiológico de un caso confirmado.
- **Contacto:** todas aquellas personas que hayan estado con el caso durante el período de transmisibilidad (4 días antes del inicio de la erupción y 4 días después).

Período de incubación: es en promedio de 14 días desde la exposición hasta la aparición del exantema, con límite de 7 a 21 días.

Mecanismo de transmisión: el sarampión se transmite por contacto directo con gotitas infecciosas expulsadas por las vías respiratorias y se propaga por el aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

El virus del sarampión puede permanecer infeccioso en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandona un área



Periodo de transmisibilidad: se calcula según la fecha de inicio del exantema por lo que es muy importante la secuencia de síntomas. El mismo va desde 4 días antes del inicio del exantema hasta 4 días después.

Diagnóstico de laboratorio

Frente a todo caso sospechoso deberán enviarse muestras para confirmación al Departamento de Laboratorios de Salud Pública situado en Alfredo Navarra 3051, acceso norte, atrás del Instituto de Higiene.

Para el diagnóstico se requiere el envío de tres muestras:

- Sangre entera sin anticoagulante: tubo seco de 5 a 8 ml.
- Orina en tubo estéril con tapa rosca (entre 10 a 15 ml).
- Hisopado nasofaríngeo en tubo con medio de transporte viral.

Realizar envío de las muestras en las primeras 48 horas de su extracción, refrigerada de 2 a 8°C.

Para la confirmación del caso se requiere:

- Detección de anticuerpos IgM específicos contra el sarampión, excepto cuando la persona ha recibido una vacuna que contenga el antígeno del sarampión entre 8 días y 6 semanas antes de la obtención de la muestra.
- Seroconversión de IgG o cuadruplicación del título de anticuerpos, excepto cuando la persona ha recibido una vacuna que contenga el antígeno del



sarampión entre 8 días y 6 semanas antes de la obtención de la muestra.

Implica la obtención de 2 muestras con un intervalo de 10 a 30 días.

- Detección del genoma del virus salvaje del sarampión en orina o hisopado nasofaríngeo.



Recomendaciones para el equipo de salud

Se recomienda:

- Capacitar al equipo de salud sobre el sarampión y sus medidas de prevención y control.
- Actualizar el estado vacunal del personal en contacto directo con usuarios.
- Mantener un alto nivel de sospecha y realizar el triage de las personas sintomáticas, a fin de implementar medidas de aislamiento respiratorio que prevengan la exposición de otras personas.
- El personal de salud que asista casos sospechosos o confirmados de sarampión debe estar correctamente inmunizado (2 dosis de SRP) o haber cursado la enfermedad previamente.
- El personal cursando alguna inmunosupresión o embarazo no asista estos casos.

Para la atención se deben implementar las siguientes medidas ³

- Precauciones estándares con énfasis en la higiene de manos y uso de Equipo de Protección Personal (EPP).
- Colocación del paciente en habitación individual de preferencia con presión negativa, manteniendo la puerta cerrada.
- Señalizar la habitación con identificación de precauciones aéreas⁴.

³ CDC. Control de infecciones en el personal sanitario: epidemiología y control de infecciones seleccionadas. Disponible en: [Epidemiología y control de infecciones](#)

⁴ MSP. Cartillas de aislamiento. Disponible en: [Cartillas de aislamiento](#)



- Educar al paciente en la implementación de medidas de higiene respiratoria.
- El personal de salud debe colocarse tapaboca N95 (realizando la prueba de ajuste y sellado), sobretúnica y guantes antes de entrar a la habitación. Retirar el EPP al salir de la habitación realizando correcto descarte e higiene de manos posterior.
- Para traslados, el paciente deberá utilizar máscara quirúrgica. Se deberá limitar el movimiento del paciente sin que ello altere las necesidades diagnósticas o terapéuticas. Dentro de su habitación puede retirarse la mascarilla.
- Las medidas aplican no solamente al personal que realiza asistencia directa sino a todos quienes ingresen en la habitación del paciente: servicios de apoyo, extraccionistas, tisanería, higiene ambiental, entre otros.
- El acompañante debe estar restringido a una sola persona que haya cursado la enfermedad o se encuentre correctamente vacunado y utilice las mismas medidas de protección.

Monitoreo de contactos

- Implementar un monitoreo diario de los signos y síntomas del sarampión desde el quinto día después de su primera exposición hasta el día 21 después de su último contacto.

Control del ambiente nosocomial



- Desinfección de objetos contaminados por secreciones respiratorias.
- Una vez que el paciente abandona la habitación, esta debe permanecer vacía y ventilada durante el tiempo adecuado (hasta 2 horas) para permitir la eliminación de los contaminantes del aire.

Duración del aislamiento de los casos

Deben permanecer en precauciones de transmisión aérea durante 4 días después de la aparición de la erupción (considerándose que la aparición de la erupción es el día 0).

Los pacientes inmunodeprimidos deben permanecer bajo precauciones de transmisión aérea durante todo el período de la enfermedad debido a la diseminación prolongada del virus.

Medidas de control en los contactos de casos confirmados de sarampión

- Búsqueda activa de contactos e identificación de susceptibles (no poder acreditar 2 dosis de vacuna con componente anti-sarampión o no haber cursado sarampión previamente).
- Implementar un monitoreo diario de los signos y síntomas del sarampión desde el quinto día después de su primera exposición a un caso de sarampión hasta el día 21 después de su última exposición.
- En personas que no puedan acreditar haber recibido 2 dosis de vacuna con componente anti-sarampión y no presenten contraindicaciones, se



recomienda la administración de la vacuna en las primeras 72 horas del contacto ya que reduce el riesgo de transmisión.

- En el caso de contactos entre 6 a 11 meses de edad, tienen indicación de dosis 0 de vacuna SRP.
- Gestantes sin evidencia de inmunidad y personas severamente inmunodeprimidas, se recomienda consultar con especialista por posibilidad de administración de inmunoglobulina análoga humana dentro de los primeros 6 días del contacto
- En caso de que los contactos correspondan a personal de salud sin ninguna dosis de vacuna y no cursaron sarampión previamente se recomiendan restricciones laborales a partir del quinto día después de su primera exposición hasta el día 21 después de su última exposición, independientemente de si recibió profilaxis posterior a la exposición.
- Se recomienda que ante la aparición de síntomas compatibles con enfermedad eruptiva febril consulte con su prestador de salud.

Vacunación contra el sarampión

La vacunación en Uruguay es universal y gratuita, siendo un programa prioritario para el Ministerio de Salud Pública. Las vacunas pueden recibirse en cualquier puesto de vacunación en todo el territorio nacional, independientemente de cuál sea su prestador de salud.

La vacuna contra el sarampión está incluida en la vacuna triple viral (SRP), que también protege contra la rubéola y la parotiditis.



El esquema de vacunación en Uruguay es el siguiente:

- Primera dosis: a los 12 meses de edad.
- Segunda dosis: a partir de los 15 meses de edad.

Todas las personas mayores de 15 meses y nacidas después de 1967 deben contar con dos dosis de la vacuna documentadas en su Certificado Esquema de Vacunación (CEV).

La vacuna está contraindicada en pacientes con historia de reacción anafiláctica grave a dosis previas o a alguno de los componentes. Las personas con alergia al huevo tienen bajo riesgo de reacciones anafilácticas a las vacunas con componente sarampión. La vacuna también está contraindicada en inmunodeprimidos y embarazadas.

Recomendaciones para viajeros

Para las personas que viajan al exterior, es fundamental asegurarse de que aquellos mayores de 15 meses tengan las dos dosis recomendadas. Además, se recomienda que los lactantes entre 6 y 11 meses que viajen a zonas con circulación activa de sarampión reciban una dosis de la vacuna al menos dos semanas antes del viaje, siempre que no tengan contraindicaciones. Esta dosis, conocida como "dosis 0", tiene como objetivo proteger al lactante ante el riesgo, aunque no se considera parte del esquema regular, por lo que deberán recibir las dosis correspondientes a los 12 y 15 meses de edad.



Cabe destacar que, en Uruguay para solicitar la residencia, según el Decreto PE 12-001- 3-4073-2018, deberá acreditar tener el esquema de vacunaciones al día y en consonancia con lo recomendado para el territorio nacional siendo de carácter gratuito en cualquier prestador de salud.



Sífilis

En la tabla 18 se presenta la distribución de casos notificados de sífilis. Se considera la notificación cuando se tiene resultado positivo de RPR o VDRL, en ausencia de resultado previo.

Tabla 18. Número de casos notificados e incidencia acumulada de sífilis por departamento hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.

Departamento	Casos 2024	Casos 2025	IA 2024	IA 2025	Diferencia IA
Artigas	152	114	208.12	156.67	-51.45
Canelones	495	483	78.21	75.46	-2.75
Cerro Largo	71	52	79.18	57.99	-21.19
Colonia	175	254	131.67	190.56	58.89
Durazno	177	110	300.32	186.66	-113.66
Flores	46	34	173.88	128.53	-45.35
Florida	83	98	119.73	141.37	21.64
Lavalleja	132	193	227.03	332.69	105.66
Maldonado	1227	792	599.94	382.95	-216.99
Montevideo	2819	2104	203.64	151.99	-51.65
Paysandú	379	315	313.96	260.57	-53.39
Río Negro	54	68	91.41	114.77	23.36
Rivera	124	111	112.90	100.91	-11.99
Rocha	121	123	162.31	164.83	2.52
Salto	400	271	295.68	199.83	-95.85
San José	125	127	102.61	103.51	0.90
Soriano	167	136	200.58	163.58	-37.00
Tacuarembó	119	168	128.40	181.38	52.98
Treinta y Tres	52	51	103.07	101.10	-1.97
Total	6918	5604	193.35	156.15	-37.21



IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

Tos convulsa

Tabla 19. Número de casos e incidencia acumulada de tos convulsa por rango etario hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.

Rango etario	Casos 2024	Casos 2025	IA 2024	IA 2025	Diferencia IA
Menor de 1 año	7	10	15.82	22.72	6.90
De 1 a 4 años	0	4	0.00	2.25	2.25
De 5 a 9 años	0	0	0.00	0.00	0.00
De 10 a 14 años	0	1	0.00	0.43	0.43
De 15 a 19 años	0	0	0.00	0.00	0.00
De 20 a 24 años	0	0	0.00	0.00	0.00
De 25 a 29 años	0	0	0.00	0.00	0.00
De 30 a 34 años	0	0	0.00	0.00	0.00
De 35 a 39 años	0	1	0.00	0.40	0.40
De 40 a 44 años	0	1	0.00	0.43	0.43
De 45 a 49 años	0	0	0.00	0.00	0.00
De 50 a 54 años	0	0	0.00	0.00	0.00
De 55 a 59 años	0	0	0.00	0.00	0.00
De 60 a 64 años	0	0	0.00	0.00	0.00
De 65 a 69 años	0	0	0.00	0.00	0.00
De 70 a 74 años	0	0	0.00	0.00	0.00
De 75 y más	0	0	0.00	0.00	0.00
Total	7	17	0.20	0.47	0.28



Tabla 20. Número de casos e incidencia acumulada de tos convulsa por departamento hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.


Departamento	Casos 2024	Casos 2025	IA 2024	IA 2025	Diferencia IA
Artigas	0	1	0.00	1.37	1.37
Canelones	0	1	0.00	0.16	0.16
Cerro Largo	0	0	0.00	0.00	0.00
Colonia	1	0	0.75	0.00	-0.75
Durazno	0	0	0.00	0.00	0.00
Flores	0	0	0.00	0.00	0.00
Florida	0	0	0.00	0.00	0.00
Lavalleja	0	1	0.00	1.72	1.72
Maldonado	0	1	0.00	0.48	0.48
Montevideo	6	11	0.43	0.79	0.36
Paysandú	0	0	0.00	0.00	0.00
Río Negro	0	0	0.00	0.00	0.00
Rivera	0	0	0.00	0.00	0.00
Rocha	0	0	0.00	0.00	0.00
Salto	0	1	0.00	0.74	0.74
San José	0	0	0.00	0.00	0.00
Soriano	0	1	0.00	1.20	1.20
Tacuarembó	0	0	0.00	0.00	0.00
Treinta y Tres	0	0	0.00	0.00	0.00
Total	7	17	0.20	0.47	0.28

En el año 2024, hasta la semana epidemiológica 52 solo se habían registrado siete casos de tos convulsa, correspondientes a seis lactantes de Montevideo y un lactante de Colonia. En 2025 se registraron diecisiete casos: once en el departamento de Montevideo, nueve correspondientes a lactantes de entre 1 y 11 meses y dos casos en adultos: una mujer de 35 años y un hombre de 43 años.



Otros cuatro casos, correspondientes a preescolares de entre 1 y 3 años, se registraron en Artigas, Canelones, Lavalleja y Salto. Además se registró en Soriano un caso en un adolescente de 14 años; mientras que el caso restante se registró en Maldonado y corresponde a un lactante de 1 mes. Nueve de los catorce casos en menores de 5 años requirieron internación, tres de ellos en CTI, todos tuvieron buena evolución.

Gráfico 4. Corredor endémico tos convulsa. Uruguay, 2025.



Fuente: SG-DEVISA.



Varicela

La varicela es una enfermedad aguda y altamente contagiosa de distribución mundial, de carácter estacional con mayor incidencia al final del invierno y principios de la primavera. Es causada por el virus varicela zoster (VZV), miembro de la familia de los herpesvirus, siendo el humano el único reservorio.

En Uruguay se comenzó a vacunar contra esta enfermedad en el año 1999 y en 2014 se introdujo una segunda dosis administrada a los 5 años de edad, con un impacto positivo en la disminución de las presentaciones graves de la enfermedad, en las hospitalizaciones y los ingresos a CTI.

El análisis de los casos de varicela muestra, a nivel nacional, un incremento neto en la incidencia acumulada a la SE 52 entre 2024 y 2025. Este aumento se observa principalmente en los grupos de 15 a 29 años y en los menores de 5 años. A nivel departamental, el mayor aumento de incidencia se observa en Tacuarembó y Paysandú, mientras que Salto y Soriano presentan una reducción de la misma.

Hasta la semana 52 se registraron 99 brotes con un total de 377 casos. De estos brotes, 52 fueron intrafamiliares, 28 en establecimientos educativos y los restantes en otras instituciones. El corredor endémico acumulado de varicela muestra que la incidencia se encuentra en zona de brote.



Tabla 21. Número de casos e incidencia acumulada de varicela por rango etario hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.

Rango etario	Casos 2024	Casos 2025	IA 2024	IA 2025	Diferencia IA
Menor de 1 año	12	23	27.12	52.25	25.13
De 1 a 4 años	52	102	29.08	57.30	28.22
De 5 a 9 años	36	69	15.84	30.47	14.63
De 10 a 14 años	55	96	23.74	41.64	17.90
De 15 a 19 años	150	204	62.72	86.16	23.44
De 20 a 24 años	35	117	13.68	46.31	32.63
De 25 a 29 años	37	107	13.70	39.95	26.25
De 30 a 34 años	22	62	8.58	23.85	15.27
De 35 a 39 años	21	24	8.59	9.72	1.13
De 40 a 44 años	7	22	2.97	9.36	6.38
De 45 a 49 años	5	21	2.10	8.77	6.67
De 50 a 54 años	3	13	1.39	5.94	4.55
De 55 a 59 años	6	2	3.06	1.01	-2.05
De 60 a 64 años	2	2	1.04	1.04	0.00
De 65 a 69 años	3	1	1.77	0.58	-1.19
De 70 a 74 años	2	3	1.50	2.18	0.69
De 75 y más	2	7	0.80	2.76	1.96
Total	450	875	12.58	24.38	11.80

IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.




Tabla 22. Número de notificaciones e incidencia acumulada de notificaciones de varicela por departamento hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2024-2025.

Departamento	Casos 2024	Casos 2025	IA 2024	IA 2025	Diferencia IA
Artigas	3	6	4.11	8.25	4.14
Canelones	48	104	7.58	16.25	8.66
Cerro Largo	3	6	3.35	6.69	3.35
Colonia	27	60	20.31	45.02	24.70
Durazno	2	2	3.39	3.39	0.00
Flores	1	3	3.78	11.34	7.56
Florida	7	8	10.10	11.54	1.44
Lavalleja	4	12	6.88	20.69	13.81
Maldonado	15	31	7.33	14.99	7.65
Montevideo	161	382	11.63	27.59	15.96
Paysandú	17	67	14.08	55.42	41.34
Río Negro	1	12	1.69	20.25	18.56
Rivera	10	30	9.10	27.27	18.17
Rocha	4	6	5.37	8.04	2.67
Salto	77	49	56.92	36.13	-20.79
San José	11	25	9.03	20.38	11.35
Soriano	54	25	64.86	30.07	-34.79
Tacuarembó	4	45	4.32	48.58	44.27
Treinta y Tres	1	2	1.98	3.96	1.98
Total	450	875	12.58	24.38	11.80

IA: incidencia acumulada x 100.000 habitantes. Fuente: SG-DEVISA. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.



Gráfico 5. Corredor endémico varicela. Uruguay, 2025.



Fuente: SG-DEVISA.

Se recuerda al equipo de salud

Conceptos generales de la enfermedad

- **Agente:** Virus Varicela Zoster, perteneciente a la familia de los Herpesvirus. Una de sus características es la permanencia en forma latente en los ganglios nerviosos luego de la primoinfección.
- **Reservorio:** el ser humano.



- **Modo de transmisión:** Se transmite por vía aérea y por contacto directo con el líquido de las vesículas. Las costras no son infectantes. Puede haber transmisión transplacentaria.
- **Período de incubación y transmisibilidad:** período de incubación medio es de 14 a 16 días, con un rango de 10 a 21 días. Este período puede ser menos prolongado en los pacientes inmunocomprometidos y mayor en los que recibieron inmunoglobulina (hasta 28 días). Se transmite desde 2 a 5 días antes de la aparición del exantema y hasta que todas las lesiones estén en fase costrosa. Aquellos con alteraciones de la inmunidad pueden contagiar por períodos más prolongados.

Descripción clínica y diagnóstico de laboratorio

Es una infección viral aguda, altamente contagiosa, que puede presentar complicaciones graves locales y sistémicas. Se caracteriza clínicamente por un exantema máculo-papular, de progresión céfalo-caudal, que luego de algunas horas adquiere un aspecto vesicular, evolucionando a pústulas y formación de costras en 3 a 4 días. La principal característica clínica, es el polimorfismo de las lesiones cutáneas, que se presentan en diferentes estadios evolutivos y son altamente pruriginosas. Puede acompañarse de fiebre. La complicación más frecuente es la sobreinfección bacteriana de las lesiones y, con menor frecuencia, neumonía vírica o bacteriana, encefalitis, meningitis, glomerulonefritis y Síndrome de Reye, asociado al uso de ácido acetil-salicílico, principalmente en niños. Tiende a ser más grave en adolescentes y adultos.



Pueden darse casos de varicela en pacientes vacunados (varicela de brecha), siendo más leve que en los no vacunados, con recuperación más rápida. En inmunocomprometidos el cuadro es más grave, con mayor posibilidad de complicaciones

El diagnóstico de la infección por varicela zoster es clínico-epidemiológico. Salvo excepciones, no se requiere confirmación por laboratorio. En situaciones especiales se puede recurrir a técnicas para detección del virus en el contenido de las vesículas. Los estudios serológicos se reservan para la clasificación del estado inmune.

Susceptibilidad e inmunidad: los susceptibles de adquirir la infección son aquellas personas que no hayan desarrollado la enfermedad o que no estén vacunadas con dos dosis. La susceptibilidad es universal. La infección suele conferir inmunidad prolongada. La inmunidad activa a través de una dosis de vacuna tiene una efectividad de 70% a 90% para prevenir la infección. Sin embargo, se ha demostrado la pérdida de inmunogenicidad a largo plazo. Con dos dosis se logra una efectividad de 98% y más duradera.

Recomendaciones generales

Las recomendaciones de prevención de la varicela se basan en:

1. Medidas que no incluyen biológicos:

- Higiene personal
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.



- Evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz y boca.
- No compartir objetos personales (vasos, cubiertos, toallas).
- Evitar el contacto con personas que están cursando varicela. Si no está vacunado o nunca tuvo varicela, evite el contacto cercano con personas infectadas. Especialmente las mujeres embarazadas, bebés y personas inmunodeprimidas.
- Si tiene síntomas que considera pueden ser varicela, evite trasladarse a un centro de salud y solicite asistencia a domicilio.
- Aislamiento de la persona con varicela
- Mantener aislamiento en domicilio hasta que todas las lesiones estén secas y costrosas (generalmente unos 7 a 10 días desde la aparición de las erupciones).
- Evitar la asistencia de la persona con varicela a centros educativos, lugares donde se conglomeren personas o trabajo hasta su recuperación.
- Respetar las medidas de control de infecciones y de bioseguridad en la atención y traslado de pacientes con varicela. En entornos ambulatorios indicar al paciente el uso de máscara quirúrgica y aplicar la etiqueta de tos/higiene respiratoria, hasta que sea instalado en la habitación.

2. Medidas que incluyen biológicos:



- Vacunación según el esquema nacional: revisar indicaciones de vacunación en el Manual Nacional de Inmunizaciones 2024, disponible en:
<https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/manual-nacional-inmunizaciones-2024>
- Actualización del plan vacunal para la edad.
- Protección de exposición a personas de alto riesgo de acuerdo al Protocolo para la profilaxis post exposición frente al virus varicela Zóster, disponible en:
<https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/protocolo-para-profilaxis-post-exposicion-frente-virus-varicela-zoster>
- Vacunación de bloqueo ante casos identificados en instituciones de salud.
- Vacunación de bloqueo en brotes (según evaluación de riesgo de Epidemiología del MSP).




Infecciones respiratorias

En Uruguay la vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) y de enfermedad tipo influenza (ETI) se lleva a cabo mediante la estrategia de vigilancia centinela y monitoreo de consultas en emergencias móviles. Actualmente se cuenta con 11 centros centinela distribuidos en 6 departamentos del país.

Vigilancia de IRAG


Gráfico 6. Incidencia acumulada en personas de 15 años y más internada por infecciones respiratorias agudas graves en centros centinela por semana epidemiológica. Uruguay, 2021 - 2025.



Fuente: Sistema de Infecciones Hospitalarias.



Gráfico 7. Incidencia acumulada en personas menores de 15 años por infecciones respiratorias agudas graves en centros centinela por semana epidemiológica. Uruguay, 2021 - 2025.



Fuente: Sistema de Infecciones Hospitalarias.


Hasta la SE 52 de 2025, la incidencia acumulada de IRAG en adultos presenta una distribución similar a la observada en años anteriores. Sin embargo, en menores de 15 años se observa que entre la SE 27 y la SE 45 se superó la incidencia registrada en años anteriores para igual período. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que este año se usa una definición de caso de IRAG más sensible que la de años anteriores. Por esta razón, no es posible realizar una comparación directa con valores históricos.



En el gráfico 8 se presenta la cantidad de aislamientos según el virus identificado en los casos de IRAG. La línea negra representa el porcentaje de positividad, definido como el total de muestras positivas para uno o más agentes sobre el total de muestras analizadas.

En las últimas semanas se observa una disminución en la detección de VRS manteniéndose la detección de SARS-CoV-2 en niveles bajos. Los casos de IRAG en la región se dan fundamentalmente a expensas de Influenza A(H3N2), VRS y SARS-CoV-2⁵.

Gráfico 8. Virus identificados en infecciones respiratorias agudas graves en centros centinelas y porcentaje de positividad de las muestras analizadas, hasta la semana epidemiológica 52 Uruguay 2025.




⁵ Organización Panamericana de la Salud. Situación de Influenza, SARS CoV-2, VRS y otros virus respiratorios - Región de las Américas. Semana epidemiológica 42. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-regional-influenza-otros-virus-respiratorios-semana-epidemiologica-42-24>



Otros incluye: Enterovirus, Coronavirus, Bocavirus. Fuente: Departamento de Laboratorios de Salud Pública.

En el gráfico 9 se presenta la cantidad de aislamientos según el virus identificado en los casos de ETI. Se observa en las últimas semanas circulación de rinovirus, Influenza A H3N2, influenza B Victoria y SARS-CoV-2.


Gráfico 9. Virus identificados en enfermedad tipo influenza en centros centinelas, hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay 2025.





Monitoreo de consultas en emergencias móviles

Gráfico 10. Proporción de consultas en emergencias móviles por enfermedad respiratoria y síndrome febril hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2025.



Fuente: DEVISA.

Gráfico 11. Tasa de consultas por infección respiratoria aguda en emergencias móviles hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2025.







Gráfico 12. Corredor endémico de consultas por infección respiratoria aguda en emergencias móviles hasta la semana epidemiológica 52. Uruguay, 2025.



Fuente: DEVISA.

Informe sobre las variantes COVID-19 bajo vigilancia y su circulación en el país y en la región

Variantes bajo monitoreo (VUM) y en circulación global

La **OMS** (Organización Mundial de la Salud) mantiene varias variantes de SARS-CoV-2 en seguimiento activo, las **Variantes Bajo Monitoreo (VUM)** y **Variantes de Interés (VOI)**: XFG (Stratus o Frankenstein es una de las 7 VUM bajo monitoreo).



Tabla 23. Principales variantes de SARS-CoV-2 bajo vigilancia.

Variante	Estatus OMS	Tendencia global	Países donde circula	Severidad estimada
NB.1.8.1 (Nimbus)	VUM (desde 23 mayo)	En aumento	EE. UU., RU, India, China, otros	Leve
XFG (Stratus o Frankenstein)	VUM (desde 25 junio)	Mayor aumento	India central	Leve
LP.8.1	VUM	En descenso	Aún presente en Sudamérica y Europa	Leve
XEC, KP.3.1.1	VUM	En retroceso	Diversos países	Leve
JN.1	VOI	Baja prevalencia	Global	Leve

Relación filogenética de los linajes predominantes

Las variantes predominantes de SARS-CoV-2 en junio–julio de 2025 en el mundo —**NB.1.8.1**, **XFG**, **LP.8.1** y **XEC**— son primas filogenéticas que divergieron de **JN.1** en distintos momentos desde finales de 2023 hasta principios de 2025.

Diferencias genéticas clave entre las variantes bajo vigilancia

Las diferencias genéticas son pequeñas pero pueden ser funcionalmente relevantes, en cuanto a infectividad y evasión parcial de inmunidad. Estas variantes



tienen solo entre 3 y 10 mutaciones diferentes en toda la Spike entre sí (sobre ~1.270 aminoácidos).

- Entre JN.1 y NB.1.8.1 (Nimbus), hay ~6 cambios en Spike.
- Entre LP.8.1 y XFG (Stratus o Frankenstein), hay ~3-5 cambios.
- Todas conservan mutaciones compartidas como F456L y Q613H.

Las variantes comparten mutaciones en común (heredadas de JN.1), y mutaciones distintivas. La variante XFG (Stratus o Frankenstein) surgió por recombinación natural entre dos sub-linajes de Omicron: LF.7 y LP.8.1.2

Tabla 24. Diferencias genéticas clave entre las variantes bajo vigilancia

Variante	Mutaciones clave distintivas (en Spike)	Efecto esperado
JN.1	L455S, F456L, Q613H, T95I	Base común de todas las variantes
XEC	R346T, V445A	Cambios en dominio RBD
LP.8.1	E180V, F456L, D614G, Q613H	Mayor infectividad
NB.1.8.1	F456L, Q613H, S494P, E554K	Potencial ventaja replicativa
XFG	E180V, S494P, L455S	Posible evasión de anticuerpos



Situación en Sudamérica

Datos de Brasil y Argentina (junio 2025)

- **Brasil** (Fiocruz) aparecen en Julio NB.1.8.1 (Nimbus) y XFG (Stratus o Frankenstein).
- **Argentina** (ANLIS-Malbrán) ha reportado casos de LP.8.1 y XEC, y recientemente XFG (Stratus o Frankenstein).

En las últimas semanas, la circulación del virus en Argentina se mantiene baja. Hasta la semana epidemiológica 30 (20 al 26 de julio de 2025), solo se registraron ocho casos positivos de COVID-19 entre 80 muestras analizadas por PCR.

Confiabilidad de los datos en la región

Los datos deben interpretarse con cautela. Están sesgados geográficamente y las prevalencias son muy variables. Esto es actualmente válido a nivel global, regional y local.

Actualización de circulación de variantes en Uruguay

- La secuenciación genómica de este periodo permitió recuperar 12 genomas desde muestras provenientes de los centros centinela**. La variación encontrada, como es habitual es grande, con muestras pertenecientes a los clados 24 (C, E y H) y 25 (A, B y C).
- Tres muestras del total de 12 resultaron ser variantes Omicron del Clado 25C XFG.2 y XFG.3 del linaje XFG llamado Stratus o Frankenstein.



- Similar a lo que ocurre en Brasil y Argentina, se detectó la circulación de Nimbus, recombinantes del linaje XFC, Y linajes que ya venían circulando en la primera mitad del año de los clados 24, MC*, PC*, PG* y del linaje 25A, LP8*


Tabla 25. Datos de VUM identificadas en los centros centinelas

	Muestra	Virus	Clade	Lineage	Nombre común	Toma de muestra
1	COVID1737	SARS-CoV-2	25B	PQ.1	Nimbus	5/8/2025
2	COVID1620	SARS-CoV-2	25C	XFG.2	Frankenstein	30/7/2025
3	COVID1451	SARS-CoV-2	25C	XFG.2	Frankenstein	18/7/2025
4	COVIDp19	SARS-CoV-2	25A	LP.8.1.4		5/7/2025
5	COVID1111	SARS-CoV-2	25C	XFG.3	Frankenstein	27/6/2025
6	COVID914	SARS-CoV-2	recombinante	XFC.1		14/6/2025
7	COVID639	SARS-CoV-2	25A	LP.8.1.1		30/5/2025
8	COVID401	SARS-CoV-2	recombinante	XFC.1		4/5/2025
9	COVID383	SARS-CoV-2	24H	PC.4		1/5/2025
10	COVIDp22	SARS-CoV-2	24C	PG.6		14/3/2025
11	COVIDp21	SARS-CoV-2	24E	MC.10.1		13/3/2025
12	COVIDp18	SARS-CoV-2	24E	MC.33.1		25/2/2025

** Centros centinelas: HPR, Británico, Policial, Sem, Mautone, Amecom, Cams, Comeró, H.Paysandú, H.Las Piedras, Comeca, Mucam (ETI)



Gráfico 13. Progresión de la frecuencia relativa de los principales linajes de Omicron desde enero de 2023 a octubre de 2025, en Uruguay.



Implicancias clínicas y epidemiológicas

- **Gravedad:** no se han reportado aumentos en hospitalizaciones ni mortalidad por NB.1.8.1 ni XFG.
- **Síntomas típicos:** dolor de garganta intenso, fatiga, fiebre leve.
- Se hipotetiza mayor transmisibilidad y mejor evasión a anticuerpos
- **Vacunas:** las actualizadas para JN.1 mantienen eficacia protectora.

Fuente: Unidad Genómica del Departamento de Laboratorio de Salud Pública - MSP



Infecciones asociadas a la atención a la salud

Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), son aquellas infecciones que adquiere una persona y están asociadas a la atención brindada por personal sanitario, que ocurre en un escenario de atención de salud y que no estaban presentes ni en período de incubación al inicio del proceso asistencial, a menos que la infección esté relacionada a un proceso previo.

A nivel nacional desde el Departamento de Vigilancia en Salud se monitorea la vigilancia de casos de IAAS que es realizada por parte de las instituciones, de acuerdo con los componentes de seguimiento obligatorio vigentes, entre los cuales se incluye el reporte de brotes constituidos por casos de infección o colonización

La vigilancia se debe mantener en forma continua durante el año en todos los componentes de acuerdo con las características de cada prestador.

Los resultados de la vigilancia por componente se describen en el informe anual.⁶

A continuación, se presenta la notificación de brotes y eventos de interés notificados al sistema de vigilancia a la fecha y el acumulado anual. Entendiendo por brote a la presencia de dos o más casos de pacientes infectados/colonizados que aparecen pasadas las 48 horas del ingreso en el hospital y que tienen un vínculo epidemiológico.

⁶Ministerio de Salud Pública. Informe anual - Infecciones asociadas a la atención en salud y de resistencia antimicrobiana. 2024. Disponible en: [Informe anual - Infecciones asociadas a la atención en salud y de resistencia antimicrobiana](#)



Brotes de IAAS

Tabla 26. Brotes en curso de microorganismos según mecanismo de resistencia, casos de infección y colonización. Año 2025, al 31 de diciembre.

Fecha de inicio	Microorganismo	Mecanismo de resistencia	Casos de infección*	Casos de colonización**	Fecha de último caso (inf o col)
16/03/2025	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	NDM	3	29	02/12/2025
08/10/2025	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	BLEE	1	8	21/11/2025
11/11/2025	<i>Enterobacter cloacae</i>	NDM	2	7	06/12/2025
26/11/2025	<i>Bacilos Gram negativos</i>	NDM	0	2	27/11/2025
08/12/2024	<i>Acinetobacter baumannii</i>	OXA 23	3	6	15/12/2025
01/12/2025	<i>Virus varicela zoster</i>	-	2	0	14/12/2025
16/12/2025	<i>Enterococcus faecium</i>	ERV	0	1	16/12/2025
19/12/2025	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	NDM	1	6	25/12/2025
22/12/2025	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	NDM	0	3	22/12/2025

Pacientes infectados: aquellos que presentan un resultado microbiológico positivo para un microorganismo y cumple con los criterios de infección. **Pacientes colonizados: aquellos que presentan un resultado microbiológico positivo para un microorganismo, sin criterios de infección. ERV: Enterococo resistente a vancomicina. Fuente: CIH-DEVISA.



Tabla 27. Frecuencia absoluta de brotes finalizados y número de casos de infección y colonización, según microorganismo. Año 2025, al 31 de diciembre.

Microorganismo		Número de brotes	Número de casos	
			Infección	Colonización
Bacilos Gram negativos con mecanismo de resistencia fenotípico	NDM	9	7	36
	KPC	2	2	5
	VIM	1	0	4
	BLEE	3	9	7
Bacilos Gram negativos sin identificación de producción de betalactamasas*		10	57	7
<i>Staphylococcus aureus</i> meticilino sensible		1	6	0
<i>Enterococcus faecium</i> resistente a vancomicina		16	13	71
<i>Clostridioides difficile</i>		3	6	0
Otros microorganismos**		5	29	7

* Incluye: *Acinetobacter baumannii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella.sp*, *Serratia marcescens*, ** Incluye, *Mycobacterium tuberculosis*, *Sarcoptes scabiei*, *Virus varicela zoster*, *Virus paperas*.



Dirección:
Avda. 18 de Julio 1892,
Montevideo, Uruguay.
Teléfono: 1934



msp.gub.uy