¿Cuál es la dosis del tratamiento con nirmatrelvir y ritonavir?

Se deben tomar 300 mg de nirmatrelvir (2 comprimidos de 150 mg) y 100 mg de ritonavir (1 comprimido de 100 mg) cada 12 horas, con o sin alimentos, durante 5 días.

Tomar los tres comprimidos en el mismo momento. Se deben tragar enteros; hay que evitar masticarlos, romperlos o triturarlos.

¿Qué hacer si olvida una toma de nirmatrelvir y ritonavir?

- Si aún no han pasado 8 horas desde la hora en que debía tomar los medicamentos, tome la dosis olvidada lo antes posible y la siguiente dosis en la hora que le corresponde.
- Si ya han pasado 8 horas desde la hora en que debía tomar los medicamentos, descarte la dosis olvidada y tome la siguiente a la hora que le corresponde.

No tome el doble de comprimidos para compensar la dosis que ha olvidado.

¿Se pueden tomar otros medicamentos junto con nirmatrelvir y ritonavir?

El tratamiento de nirmatrelvir y ritonavir con otros medicamentos puede producir reacciones adversas graves. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento, sea bajo prescripción o sea de venta libre, así como vitaminas o suplementos a base de hierbas.

Tenga en cuenta que estos medicamentos no son los únicos que pueden causar efectos secundarios.

Nirmatrelvir y ritonavir

Información para pacientes

¿Qué es la combinación de nirmatrelvir con ritonavir?

Es un tratamiento para la COVID-19 leve o moderada en pacientes que presenten un riesgo alto de hospitalización. Consta de dos medicamentos antivirales dispensados en un mismo empaque comercializado como PaxlovidTM.

Este medicamento no reemplaza la vacuna contra la COVID-19 ni previene el contagio del SARS-CoV-2.

UNIÓN EUROPEA
Ministerio de Salud Pública
OPS

¿Se debe evitar el embarazo durante el tratamiento con nirmatrelvir y ritonavir y después de él?

Las personas en edad reproductiva deben abstenerse de tener relaciones sexuales o bien utilizar métodos anticonceptivos.

Las personas que utilizan anticonceptivos hormonales combinados deben consultar a su médico sobre la necesidad de utilizar un método anticonceptivo alternativo durante el tratamiento.

¿Se puede usar el tratamiento de nirmatrelvir y ritonavir en menores de 18 años o durante el embarazo o la lactancia?

No se recomienda para los menores de 18 años ni para las personas embarazadas, ya que no se dispone de evidencia sobre su eficacia y seguridad en esos casos.

Se recomienda no amamantar durante el tratamiento con nirmatrelvir y ritonavir ni durante los 7 días siguientes a la última dosis.

¿Quiénes no deben recibir el tratamiento de nirmatrelvir y ritonavir?

- Las personas alérgicas al nirmatrelvir, al ritonavir o a cualquiera de los demás componentes de estos medicamentos.
- Los individuos con enfermedad hepática o renal grave.

¿Tiene el tratamiento de nirmatrelvir y ritonavir efectos secundarios?

Al igual que todos los medicamentos, puede producir efectos secundarios no deseados. Consulte al centro de salud más cercano o a su médico si presenta alguno de los siguientes:

- Dificultad para respirar, inflamación de la cara, labios, lengua o cualquier parte del cuerpo.
- Problemas hepáticos: pérdida del apetito, coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos, orina de color oscuro, heces de color pálido y picazón en la piel, dolor en el área del estómago (abdominal).

IMPORTANTE

- Debe completar el tratamiento (5 días) aunque sienta mejoría antes de terminarlo.
- No comparta estos medicamentos con otras personas aun cuando los signos de la enfermedad sean similares.
- La combinación de nirmatrelvir con ritonavir requiere prescripción médica.

Los medicamentos deben conservarse en su empaque original, en lugar fresco y seco, lejos de la humedad, el calor y la luz solar.

	Día 1 Fecha:.....	Día 2 Fecha:.....	Día 3 Fecha:.....	Día 4 Fecha:.....	Día 5 Fecha:.....
Mañana 2 comprimidos × 150 mg de nirmatrelvir y 1 comprimido × 100 mg de ritonavir					
Tarde 2 comprimidos × 150 mg de nirmatrelvir y 1 comprimido × 100 mg de ritonavir					