

CONTINUACION DE ESQUEMA DE VACUNACIÓN FRENTE A COVID-19 EN CONTEXTO DE INFECCIÓN POSTVACUNAL

Grupo Etario	Plataforma	Antes de iniciar el esquema?	Entre		Antes de			Observaciones
			1era dosis	2da dosis	3era dosis	4ta dosis	5ta dosis	
5 a 11 años	Pfizer pediátrica	SI, se deben esperar al menos 3 meses después del diagnóstico para iniciar el esquema.	SI, se debe esperar al menos 3 meses después del diagnóstico para recibir la 2da dosis		NO SE ADMINISTRA	NO SE ADMINISTRA	NO SE ADMINISTRA	En el caso de cursar COVID-19 complicado con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico se debe esperar al menos 3 meses para iniciar el esquema. En caso de compromiso cardíaco secundario a infección por COVID-19 se vacunará con indicación de médico tratante
12 a 17 años	Pfizer adultos	SI, se deben esperar al menos 30 días después del diagnóstico de COVID-19 para iniciar el esquema	SI, se deben esperar al menos 30 días después del diagnóstico de COVID-19 para recibir la 2da dosis		SI, solo en situaciones especiales (factores de riesgo) a los 4 meses del diagnóstico de COVID-19.	NO se administra salvo circunstancias especiales previo análisis de caso.	NO SE ADMINISTRA	
Mayores de 18 años	CoronaVac				SI, una dosis de Pfizer. En inmunocompetentes al menos 3 meses del diagnóstico de COVID-19. En inmunodeprimidos se administrará al menos 1 mes después del diagnóstico de COVID-19.	SI, con vacuna Pfizer, en inmunocompetentes, se autoriza al menos 4 meses de la última dosis , en inmunodeprimidos al menos 1 mes después del diagnóstico.	SI, se administrará 1 dosis de vacuna Pfizer a los 4 meses después del diagnóstico de COVID-19.	
	Pfizer adultos	SI, se deben esperar al menos 30 días después del diagnóstico de COVID-19 para iniciar el esquema	SI, se deben esperar al menos 30 días después del diagnóstico de COVID-19 para recibir la 2da dosis		SI, en inmunocompetentes al menos 4 meses del diagnóstico de COVID-19. En inmunodeprimidos se administrará al menos 1 mes después del diagnóstico de COVID-19 con vacuna Pfizer	SI, en inmunodeprimidos e inmunocompetentes al menos 4 meses después del diagnóstico.	NO SE ADMINISTRA	
Mayores de 59 años	AstraZeneca (No disponible para inicio)				SI, una dosis de Pfizer. En inmunocompetentes al menos 4 meses después del diagnóstico de COVID-19. En inmunodeprimidos se administrará al menos 1 mes después del diagnóstico de COVID-19.	SI, en inmunodeprimidos e inmunocompetentes al menos 4 meses después del diagnóstico, con vacuna Pfizer.	NO SE ADMINISTRA	