

Inmunocompetente (Inicios y continuación de esquemas)

| | Plataforma | 1era dosis | 2da dosis | 3era dosis | 4ta dosis | 5ta dosis |
|---------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5-11 años | Pfizer pediátrica | Si | Al menos 6 semanas de la 1era dosis. En caso de haber cursado COVID-19 se recomienda esperar 6 semanas | No se recomienda | No se recomienda | No se recomienda |
| 12 a 17 años | Pfizer adulto | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19, si tiene comorbilidades. | No se recomienda | No se recomienda |
| 18 a 49 años | CoronaVac | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis. En caso de haber cursado COVID-19 se recomienda esperar 4 semanas | Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 con vacuna Pfizer | Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 si tiene comorbilidades con vacuna Pfizer | No se recomienda |
| | Pfizer adulto | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 | No se recomienda | |
| 50-69 años | CoronaVac | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis. En caso de haber cursado COVID-19 se recomienda esperar 4 semanas | Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 con vacuna Pfizer | Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 si tiene comorbilidades, con vacuna Pfizer | A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o del diagnóstico de COVID-19 |
| | Pfizer adulto | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 si tiene comorbilidades | A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o del diagnóstico de COVID-19 |
| 70-79 años | Pfizer adulto | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 | A partir de los 4 meses de la última dosis recibida o haber cursado COVID-19 | A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o del diagnóstico de COVID-19 |
| 80 años en adelante | Pfizer adulto | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 | A partir de los 4 meses de la última dosis recibida o haber cursado COVID-19 | A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o del diagnóstico de COVID-19 |

*CON VACUNA ASTRAZENECA, CONTINUAR COMO ESQUEMA PFIZER

** PERSONAL DE SALUD A PARTIR DE LOS 18 AÑOS LLEVA 4TA DOSIS, RECIBE EL RESTO DE DOSIS SEGÚN RIESGO INDIVIDUAL

Dosis complementaria a administrarse a partir del 26/12/2022 en Montevideo y del 02/01/2022 en el interior



Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

División Epidemiología

Unidad de Inmunizaciones

Inmunodeprimidos (Inicios y continuación de esquemas)

| | Plataforma | 1era dosis | 2da dosis | 3era dosis | 4ta dosis | 5ta dosis | 6ta dosis |
|---------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5-11 años | Pfizer pediátrica | Si | Al menos 6 semanas de la 1era dosis. En caso de haber cursado COVID-19 se recomienda esperar 6 semanas | Evaluar caso a caso | No se recomienda | No se recomienda | No se recomienda |
| 12 a 17 años | Pfizer adulto | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 | Evaluar caso a caso | No se recomienda | No se recomienda |
| 18 a 49 años | CoronaVac | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19 | Al menos 4 semanas después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 vacuna Pfizer | Al menos 4 semanas después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 vacuna Pfizer | Al menos 4 meses después de la 4ta dosis o del diagnóstico de COVID-19 | A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o de haber cursado COVID-19. |
| | Pfizer adulto | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 | A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o de haber cursado COVID-19. | No se recomienda |
| 50-69 años | CoronaVac | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19 | Al menos 4 semanas después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 vacuna Pfizer | Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 vacuna Pfizer | Al menos 4 meses después de la 4ta dosis o del diagnóstico de COVID-19 | A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o de haber cursado COVID-19. |
| | Pfizer adulto | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 | A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o de haber cursado COVID-19. | No se recomienda |
| 70-79 años | Pfizer adulto | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 | A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o de haber cursado COVID-19. | No se recomienda |
| 80 años en adelante | Pfizer adulto | Si | Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 | Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 | A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o de haber cursado COVID-19. | No se recomienda |

***CON VACUNA ASTRAZENECA, CONTINUAR COMO ESQUEMA PFIZER**

**** PERSONAL DE SALUD A PARTIR DE LOS 18 AÑOS LLEVA 4TA DOSIS, RECIBE EL RESTO DE DOSIS SEGÚN RIESGO INDIVIDUAL**

Dosis complementaria a administrarse a partir del 26/12/2022 en Montevideo y del 02/01/2022 en el interior



Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

División Epidemiología

Unidad de Inmunizaciones