

## Inmunocompetente (Inicios y continuación de esquemas)

	Plataforma	1era dosis	2da dosis	3era dosis	4ta dosis	5ta dosis
5-11 años	Pfizer pediátrica	Si	Al menos 6 semanas de la 1era dosis. En caso de haber cursado COVID-19 se recomienda esperar 6 semanas	No se recomienda	No se recomienda	No se recomienda
12 a 17 años	Pfizer adulto	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19	Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19, si tiene comorbilidades.	No se recomienda	No se recomienda
18 a 49 años	CoronaVac	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis. En caso de haber cursado COVID-19 se recomienda esperar 4 semanas	Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 con vacuna Pfizer	Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 si tiene comorbilidades con vacuna Pfizer	No se recomienda
	Pfizer adulto	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19	Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19	No se recomienda	
50-69 años	CoronaVac	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis. En caso de haber cursado COVID-19 se recomienda esperar 4 semanas	Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 con vacuna Pfizer	Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 si tiene comorbilidades, con vacuna Pfizer	A partir de los 6 meses de la última dosis recibida. En caso de haber cursado COVID-19 o de haber cursado la enfermedad
	Pfizer adulto	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19	Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19	Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 si tiene comorbilidades	A partir de los 6 meses de la última dosis recibida. En caso de haber cursado COVID-19 o de haber cursado la enfermedad.
70-79 años	Pfizer adulto	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19	Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19	A partir de los 4 meses de la última dosis recibida o haber cursado COVID-19	A partir de los 6 meses de la última dosis recibida. En caso de haber cursado COVID-19 o de haber cursado la enfermedad.
80 años en adelante	Pfizer adulto	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19	Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19	A partir de los 4 meses de la última dosis recibida o haber cursado COVID-19	A partir de los 6 meses de la última dosis recibida. En caso de haber cursado COVID-19 o de haber cursado la enfermedad.

\*CON VACUNA ASTRAZENECA, CONTINUAR COMO ESQUEMA PFIZER

\*\* PERSONAL DE SALUD A PARTIR DE LOS 18 AÑOS LLEVA 4TA DOSIS, RECIBE EL RESTO DE DOSIS SEGÚN RIESGO INDIVIDUAL

**DOSIS COMPLEMENTARIA A ADMINISTRARSE A PARTIR DEL 26/12/2022**



Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

División Epidemiología

Unidad de Inmunizaciones

# Inmunodeprimidos (Inicios y continuación de esquemas)

	Plataforma	1era dosis	2da dosis	3era dosis	4ta dosis	5ta dosis	6ta dosis
5-11 años	Pfizer pediátrica	Si	Al menos 6 semanas de la 1era dosis. En caso de haber cursado COVID-19 se recomienda esperar 6 semanas	<b>Evaluar caso a caso</b>	<b>No se recomienda</b>	<b>No se recomienda</b>	<b>No se recomienda</b>
12 a 17 años	Pfizer adulto	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19	Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19	<b>Evaluar caso a caso</b>	<b>No se recomienda</b>	<b>No se recomienda</b>
18 a 49 años	CoronaVac	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19	Al menos 4 semanas después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 con vacuna Pfizer	Al menos 4 semanas después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 vacuna Pfizer	Al menos 4 meses después de la 4ta dosis o del diagnóstico de COVID-19	A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o de haber cursado COVID-19.
	Pfizer adulto	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19	Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19	Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19	A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o de haber cursado COVID-19.	<b>No se recomienda</b>
50-69 años	CoronaVac	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19	Al menos 4 semanas después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19 vacuna Pfizer	Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19 vacuna Pfizer	Al menos 4 meses después de la 4ta dosis o del diagnóstico de COVID-19	A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o de haber cursado COVID-19.
	Pfizer adulto	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19	Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19	Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19	A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o de haber cursado COVID-19.	<b>No se recomienda</b>
70-79 años	Pfizer adulto	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19	Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19	Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19	A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o de haber cursado COVID-19.	<b>No se recomienda</b>
80 años en adelante	Pfizer adulto	Si	Al menos 4 semanas después de la 1era dosis o de haber cursado COVID-19	Al menos 4 meses después de la 2da dosis o del diagnóstico de COVID-19	Al menos 4 meses después de la 3era dosis o del diagnóstico de COVID-19	A partir de los 6 meses de la última dosis recibida o de haber cursado COVID-19.	<b>No se recomienda</b>

**\*CON VACUNA ASTRAZENECA, CONTINUAR COMO ESQUEMA PFIZER**

**\*\* PERSONAL DE SALUD A PARTIR DE LOS 18 AÑOS LLEVA 4TA DOSIS, RECIBE EL RESTO DE DOSIS SEGÚN RIESGO INDIVIDUAL**

**DOSIS COMPLEMENTARIA A ADMINISTRARSE A PARTIR DEL 26/12/2022**



Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

División Epidemiología

Unidad de Inmunizaciones