

FICHA TÉCNICA 2

Uso de la leche humana extraída refrigerada para su propio hijo en unidades neonatales

N°	AGENTE	ACCIÓN	OBSERVACIÓN	COMENTARIOS
01	Funcionario	Llevar a temperatura ambiente las alícuotas en los horarios pre-determinados en la prescripción y encaminar para la administración.		
02	Funcionario	Verificar: nombre de la madre, del receptor, volumen, horario y vía de administración en la prescripción de la dieta.		
03	Funcionario	De ser necesario el transporte de la leche humana extraída dentro de la misma institución, debe hacerse en cajas isotérmicas	Las cajas isotérmicas deben ser previamente sanitizadas con alcohol a 70 % y sin hielo reciclable, pues la leche estará a temperatura ambiente.	
04	Funcionario	Realizar la alimentación de acuerdo a lo prescrito.		
05	Funcionario	Utilizar el procedimiento de administración descrito en el protocolo del servicio de Neonatología.	<p>Siempre manipular el recipiente conteniendo la leche humana extraída con guante de procedimiento.</p> <p>El tiempo máximo que la leche puede quedar en infusión es de 3 (tres) horas.</p> <p>Si se utiliza bomba de infusión, para que no haya grasa en la pared de la jeringa, de tiempos en tiempos, la jeringa debe ser retirada y la leche agitada suavemente. La jeringa debe quedar siempre dispuesta con el pivote para arriba</p>	