

GARPR Online Reporting Tool

Uruguay - 2016

I Formulario

1) ¿Qué instituciones/entidades fueron responsables de completar los formularios de indicadores?

a) Comité Nacional de Sida o equivalente: Sí

b) Programa Nacional de Sida: Sí

c) Otros: Sí

Si son otros, especifique: Dr. Andrés Bálsamo, Departamento de Vigilancia en Salud. Lic. Enf. Estela de Armas, Programa de Violencia y Salud. Dr. Rafael Aguirre, Programa Salud de las Mujeres. Lic. Psi. Cristina Espasandin, Área SSyR. Dr. Fernando Arrieta, Programa de TB.

2) Con la colaboración de

Ministerio de Educación: No

Ministerio de Salud: Sí

Ministerio de Trabajo: No

Ministerio de Asuntos Exteriores: No

Otro Ministerio: Sí

Si es otro Ministerio, especifique: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior

Organizaciones de la sociedad civil: Sí

Personas que viven con el VIH: Sí

Sector privado: No

Organizaciones de Naciones Unidas: Sí

Organizaciones bilaterales: Sí

ONG internacionales: No

Otros: Sí

Si son otros, especifique: Universidad de la República; Administración de Servicios de Salud del Estado

3) ¿Se dialogó sobre el informe en un gran foro?: Sí

4) ¿Están los resultados de la encuesta almacenados centralmente?: Sí

5) ¿Están disponibles los datos para su consulta pública?: Sí

6) ¿Quién es la persona responsable del envío del informe?

Nombre(s) / puesto(s):: Susana Cabrera. Responsable Área Programática ITS-VIH/Sida Ministerio de Salud

Dirección(es):: 18 de julio 1892

Correo(s) electrónico(s):: scabrera@msp.gub.uy susanacabrera1@gmail.com.uy

Teléfono(s):: 598 1934

II Informe

Visión general:

COMPROMISO 1. Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020:

COMPROMISO 2. Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018:

COMPROMISO 3. Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y los presos):

COMPROMISO 4. Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020:

COMPROMISO 5. Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año:

COMPROMISO 6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020:

COMPROMISO 7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020:

COMPROMISO 8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales:

COMPROMISO 9. Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos:

COMPROMISO 10. Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de

cuello de útero y la hepatitis B y C:

1.1 Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto del VIH

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

Escriba cualquier dato que considere relevante procedente de sistemas de vigilancia basados en casos de VIH y encuesta de población con prueba del VIH. Asimismo, facilite cualquier información adicional relacionada con los datos introducidos en el cuadro "Información adicional..." en la parte inferior de esta página.

1. Notificaciones de casos de VIH provistos por sistemas de vigilancia rutinarios

¿Están los datos disponibles?: Sí

Fuente: Departamento de Vigilancia en Salud

Año en que empezó la presentación de informes nacional basada en casos: 2008

	Todo	Hombres (todas las edades)	Hombres (0-14)	Hombres (15-49)	Hombres (50+)	Mujeres (todas las edades)	Mujeres (0-14)	Mujeres (15-49)	Mujeres (50+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico a la conclusión del periodo del que se informa									
A : Número total de personas que viven con el VIH diagnosticado	13346	8192	92	5900	2200	5154	54	4200	900
B : Número total de muertes relacionadas con el sida	3466	2633	4	1576	1053	833	3	689	141
Numerador (A - B) : El número de personas diagnosticadas con el VIH y notificadas al sistema de vigilancia que aún siguen vivas	10169	5559	88	4324	1147	4610	51	3775	784
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH (por ejemplo, extraído de Spectrum)									

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: Sí

Datos sub-nacionales

Rango de edad:

Fuente:

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Numerador	Denominador
---------------------	-----------	-------------

2. Encuesta basada en la población nacional con prueba del VIH y una pregunta directa sobre el conocimiento del estado serológico (es decir, número de participantes de la encuesta diagnosticados con el VIH en su última prueba del VIH y que también dieron positivo en la prueba del VIH de la encuesta)

¿Están los datos disponibles?: No

Fuente:

Año:

	Todos los adultos	Todos los adultos hombres	Todos los adultos mujeres	Todos los niños y niñas	Todo
Rango de edad (por ejemplo, 15+, 15-49, etc.)					
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas seropositivas que conocen su estado serológico					
Numerador : Número de participantes que comunican que fueron diagnosticados con el VIH en su última prueba para el VIH y que también resultaron VIH-positivos en la encuesta					
Denominador : Número de personas con resultado de VIH-positivo en la encuesta					

Datos sub-nacionales

Rango de edad:

Fuente:

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Numerador	Denominador
---------------------	-----------	-------------

3. Encuesta basada en la población nacional con biomarcadores de VIH con una pregunta indirecta sobre el conocimiento del estado serológico, más datos de programas sobre la proporción de personas que reciben tratamiento. Rellene datos para las partes a) y b).

¿Están los datos disponibles?: No

a) El porcentaje de personas diagnosticadas con el VIH en la encuesta que informan haber realizado las pruebas del VIH en algún momento y de haber recibido el resultado de la última prueba

Fuente:

Año:

	Todos los adultos	Todos los adultos hombres	Todos los adultos mujeres	Todos los niños y niñas	Todo
Rango de edad (por ejemplo, 15+, 15-64)					
Porcentaje : El porcentaje de personas diagnosticadas con el VIH en la encuesta que informan haber realizado las pruebas del VIH en algún momento y de haber recibido el resultado de la última prueba					
Numerador : Número de personas seropositivas que se habían realizado previamente las pruebas del VIH y habían recibido los últimos resultados					
Denominador : Número de personas seropositivas en la encuesta					

Datos sub-nacionales

Rango de edad:

Fuente:

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Numerador	Denominador

b) El porcentaje de personas que viven con el VIH que reciben tratamiento antirretroviral según se incluye en el indicador 1.2

Fuente:

Año:

	Todos los adultos	Todos los adultos hombres	Todos los adultos mujeres	Todos los niños y niñas	Todo
Porcentaje					
Numerador : Número de personas seropositivas que reciben tratamiento antirretrovírico					
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH (por ejemplo, extraído de Spectrum)					

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: No

Resultados de un método de encuesta indirecto

	Todos los adultos	Todos los adultos hombres	Todos los adultos mujeres	Todos los niños y niñas	Todo
Porcentaje : Porcentaje de personas seropositivas que conocen su estado serológico					

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos específicos de ciudades

Rango de edad:

Fuente:

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Número total de personas que viven y conocen su estado serológico	Número estimado de personas que viven con el VIH
--------	---	--

1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 31/12/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los denominadores del archivo final de Spectrum: Sí

Porcentaje total y desglosado por sexo

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Porcentaje (%) : Porcentaje y número de adultos y niños que reciben terapia antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH a la conclusión del periodo de del que se informa				
Numerador : Número de personas que reciben terapia antirretroviral a la conclusión del periodo sobre el que se informa	6361	2162	4199	
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH				
De inicio reciente : Número de personas que inician por primera vez terapias antirretrovirales durante el año para el que se presentan los informes esos datos deberán estar disponibles a través de las mismas fuentes que el número total de personas que reciben terapias antirretrovirales	916	570	344	
Elegibles para tratamiento : Número de personas elegibles para el tratamiento en países en que la elegibilidad para terapias para el VIH, de acuerdo con directrices nacionales sobre criterios de elegibilidad, es un subconjunto de todas las personas que viven con el VIH.				

Desglosado por grupo etario amplio

	<15	15+	Edad desconocida
Porcentaje (%) : Porcentaje y número de adultos y niños que reciben terapia antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH a la conclusión del periodo de del que se informa			
Numerador : Número de personas que reciben terapia antirretroviral a la conclusión del periodo sobre el que se informa	100	6261	
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH			
De inicio reciente : Número de personas que inician por primera vez terapias antirretrovirales durante el año para el que se presentan los informes esos datos deberán estar disponibles a través de las mismas fuentes que el número total de personas que reciben terapias antirretrovirales	2	914	
Elegibles para tratamiento : Número de personas elegibles para el tratamiento en países en que la elegibilidad para terapias para el VIH, de acuerdo con directrices nacionales sobre criterios de elegibilidad, es un subconjunto de todas las personas que viven con el VIH.			

Desagregado por grupos de edad

	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-49	50+
Porcentaje (%) : Porcentaje y número de adultos y niños que reciben terapia antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH a la conclusión del periodo de del que se informa								
Numerador : Número de personas que reciben terapia antirretroviral a la conclusión del periodo sobre el que se informa	2	8		45				
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH								
De inicio reciente : Número de personas que inician por primera vez terapias antirretrovirales durante el año para el que se presentan los informes esos datos deberán estar disponibles a través de las mismas fuentes que el número total de personas que reciben terapias antirretrovirales	2							
Elegibles para tratamiento : Número de personas elegibles para el tratamiento en países en que la elegibilidad para terapias para el VIH, de acuerdo con directrices nacionales sobre criterios de elegibilidad, es un subconjunto de todas las personas que viven con el VIH.								

Desglosado por sector

	Sector público	Sector privado
Numerador : Número de personas que reciben terapia antirretroviral a la conclusión del periodo sobre el que se informa		

Comunicado a través de un sistema de distribución de medicamentos

	Valor de datos
Número : Número de personas que reciben terapias antirretrovirales según se dé cuenta de tal número a través del sistema de distribución de medicamentos del país.	

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Todas las edades - Porcentaje	Todas las edades - Numerador	Todas las edades - Denominador	Niños (<15) - Porcentaje	Niños (<15) - Numerador	Niños (<15) - Denominador	Adultos (15+) - Porcentaje	Adultos (15+) - Numerador	Adultos (15+) - Denominador
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	----------------	-----------	-------------

1.3 Retención en la terapia antirretroviral a los 12 meses

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Estado de embarazo al iniciar la terapia	Estado de lactancia al iniciar la terapia
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños que viven con el VIH de los que se conoce que siguen recibiendo la terapia antirretroviral 12 meses después de su inicio	84.5	85.6	82	100			
Numerador : Número de adultos y de niños que siguen vivos y que reciben terapia antirretroviral 12 meses después de iniciar el tratamiento en 2015	770	488	280	2			
Denominador : Número total de adultos y niños que iniciaron su terapia antirretroviral en el año 2015, dentro del periodo sobre el que se informa, con inclusión de las personas que hayan muerto después de iniciar esa terapia, de quienes hayan suspendido su tratamiento y de aquellos sujetos de los que se haya registrado que se ha perdido su seguimiento en el mes 12.	914	570	344	2			

Información adicional: además de las personas que siguen con vida y en terapia antirretrovírica, facilite también información de otros resultados a los 12 meses de iniciar el tratamiento

	Valor de datos
Seguimiento interrumpido	
Abandono de la terapia	
Fallecimiento	

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	----------------	-----------	-------------

1.4 Personas que viven con el VIH que tienen la carga viral suprimida

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Datos de programas rutinarios (preferido)

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los denominadores del archivo final de Spectrum: Sí

I. Pruebas rutinarias sobre supresión de carga vírica resultantes de datos clínicos y de programas

Porcentaje total y desglosado por sexo

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica a la conclusión del periodo sobre el que se informa				
Numerador : Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que han suprimido su carga vírica (≤ 1.000 copias/ml)	5450			
Número de personas que se realizaron las pruebas : Número de personas que se realizaron las pruebas de supresión vírica durante el último año de notificación				
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH				

Desglosado por grupo etario amplio

	<15	15+	Edad desconocida
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica a la conclusión del periodo sobre el que se informa			
Numerador : Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que han suprimido su carga vírica (≤ 1.000 copias/ml)			
Número de personas que se realizaron las pruebas : Número de personas que se realizaron las pruebas de supresión vírica durante el último año de notificación			
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH			

Desagregado por grupos de edad

	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-49	50+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica a la conclusión del periodo sobre el que se informa								
Numerador : Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que han suprimido su carga vírica (≤ 1.000 copias/ml)								
Número de personas que se realizaron las pruebas : Número de personas que se realizaron las pruebas de supresión vírica durante el último año de notificación								
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH (extraída de GARPR 4.1, no es necesario rellenarla)								

II. Encuestas poblacionales nacionalmente representativas, incluidas encuestas para el indicador sobre alerta temprana y resistencia a medicamentos

Porcentaje total y desglosado por sexo

	Total	Hombres	Mujeres
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica a la conclusión del periodo sobre el que se informa			
Numerador : Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que han suprimido su carga vírica (≤ 1.000 copias/ml) La proporción de sujetos de que se informe que han suprimido su carga vírica entre los individuos para los que se detecte la terapia antirretroviral en muestras (en contraposición a datos autodeclarados) deberá multiplicarse por el número total de personas que reciban terapias antirretrovirales a la conclusión del periodo del que se informa (con referencias cruzadas sobre el indicador 1.2) para estimar nacionalmente el número de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica.			
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH			
Tamaño de la muestra : Número de entrevistados en la encuesta			

Desglosado por grupo etario amplio

	<15	15+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica a la conclusión del periodo sobre el que se informa		
Numerador : Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que han suprimido su carga vírica (≤ 1.000 copias/ml)		
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH		
Tamaño de la muestra : Número de entrevistados en la encuesta		

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	----------------	-----------	-------------

1.5 Diagnóstico tardío del VIH

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: En el periodo 1 enero 2015-31 diciembre 2015, el 18% de los nuevos diagnósticos fueron notificados en el curso de una enfermedad marcadora de etapa SIDA, de ellos el 70% corresponde al sexo masculino. El 68% de los casos notificados con una enfermedad marcadora de etapa SIDA provienen del sector público.

Personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm³

	Todo	Hombres	Mujeres	<15	15+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3 durante el periodo del que se informa					
Numerador : Número de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3 durante el periodo del que se informa					
Denominador : Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 durante el periodo del que se informa					

Personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3

	Todo	Hombres	Mujeres	<15	15+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3 durante el periodo del que se informa					
Numerador : Número de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3 durante el periodo del que se informa					
Denominador : Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 durante el periodo del que se informa					

1.6 Desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición: Fiscalización de stock en farmacias realizada por el Ministerio de Salud

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 31/12/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	clínica general	centro maternoinfantil	centro para el tratamiento de la tuberculosis
Porcentaje (%) : Porcentaje de centros de tratamiento que se quedan sin existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido	9.5			
Numerador : Porcentaje de instalaciones sanitarias que dispensan medicamentos antirretrovirales que experimentan agotamientos de existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido	4			
Denominador : Número total de instalaciones sanitarias que dispensan medicamentos antirretrovirales durante ese mismo periodo	42			

1.7 Mortalidad relacionada con el sida

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Sistema de registro vital

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Todas las edades

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Tasa : Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas que murieron por causas relacionadas con el sida en 2016				
Denominador : Población total independientemente del estado serológico respecto del VIH				

< 5 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades <5 años) que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades <5 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en 2016				
Denominador : Población total (de edades <5 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

5-14 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades 5-14 años) que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades 5-14 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en 2016				
Denominador : Población total (de edades 5-14 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

15+ años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades 15 o más años) que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades 15 o más años) que murieron por causas relacionadas con el sida en 2016				
Denominador : Población total (de edades 15 o más años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Indice - Total	Numerador - Total	Denominador - Total	Indice - Hombres	Numerador - Hombres	Denominador - Hombres	Indice - Mujeres	Numerador - Mujeres	Denominador - Mujeres
---------------------	----------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Número de personas que murieron por causas relacionadas con el sida en 2016
--------	---

2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición: Auditorías de casos: todas las mujeres con VIH que tuvieron su parto en el año 2015

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 31/12/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de hijos de madres seropositivas que recibieron una prueba virológica del VIH en sus dos primeros meses de vida	100
Numerador : Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida, durante el periodo de presentación de informes. Los niños que recibieron las pruebas solo deben contarse una vez	112
Resultado de la prueba - Positivo	2
Resultado de la prueba - Negativo	110
Resultado de la prueba - Indeterminado	0
Resultado de la prueba - Rechazado por el laboratorio	0
Resultado de la prueba - Otro	0
Denominador : Número de mujeres seropositivas embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	112

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: No

2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Análisis de cohortes

Otra herramienta/fuente de medición: Auditorías de casos: mujeres con VIH que tuvieron su parto en el 2015

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión maternoinfantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores	1.8
Numerador : Número de niños que contraen la infección por el VIH por transmisión maternoinfantil entre los niños nacidos en los 12 meses anteriores de mujeres que viven con el VIH.	2
Denominador : Número estimado de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que hayan dado a luz en los 12 meses anteriores	112

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: No

2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Numerador obtenido de los registros de las clínicas de atención prenatal/prevencción de la transmisión materno-infantil y sobre los pacientes que reciben terapia antirretroviral

Otra herramienta/fuente de medición: Auditorías

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas seropositivas que recibió antirretroviricos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil	95.5
Numerador : Número de mujeres seropositivas que dieron a luz y recibieron medicamentos antirretroviricos durante los últimos 12 meses para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil durante el embarazo y el parto Los informes mundiales que sintetizan la cobertura de medicamentos antirretrovirales para la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH excluirán a mujeres que hayan recibido una dosis única de nevirapina, dado que ese se considera un régimen subóptimo. Sin embargo, los países deberían reportar este valor.	107
1. Iniciaron de la terapia antirretroviral durante el embarazo	54
2. Ya seguían la terapia antirretroviral antes del embarazo actual	44
3. Profilaxis antirretroviral triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	
4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS)	
5. Monodosis de Nevirapina, únicamente (con o sin cola) Nótese que el valor final publicado para la cobertura de la prevención materno-infantil no incluye monodosis de nevirapina. Sin embargo, estos datos se recopilan en la herramienta de presentación de informes durante el periodo de retirada progresiva.	0
6. Otras (comente: por ejemplo, régimen específico, sin categorizar, etc.) En el cuadro de Comentario, para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.	9
Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que siguen un tratamiento antirretroviral de por vida	98
Denominador : Número estimado de mujeres embarazadas con VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	112

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: No

Para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.: Detección en trabajo de parto por lo que recibieron AZT y luego del parto iniciaron TARV

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Porcentaje (%)	Número total de mujeres embarazadas seropositivas que dieron a luz y recibieron medicamentos antirretroviricos	1. Iniciaron de la terapia antirretroviral durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretroviral antes del embarazo actual	3. Profilaxis antirretroviral triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS o directrices de la OMS de 2006)	5. Monodosis de Nevirapina, únicamente (con o sin cola)	6. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que siguen un tratamiento antirretroviral de por vida	Denominador

Alternativamente, puede [descargar éste formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (%)	Número total de mujeres embarazadas seropositivas que dieron a luz y recibieron medicamentos antirretrovíricos	1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	3. Profilaxis antirretrovírica triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS o directrices de la OMS de 2006)	5. Monodosis de Nevirapina, únicamente (con o sin cola)	6. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que siguen un tratamiento antirretrovírico de por vida	Denominador
--------	----------------	--	---	---	---	--	---	----------	--	-------------

2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Datos del programa nacional

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 31/12/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: A partir de los registros de prueba reactiva no treponémica o treponémica en el SIP y/o en el Certificado de Nacido Vivo se realiza auditoría de casos

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:

Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país para definir si una mujer embarazada da positivo::

No treponémica (RPR, VDRL), Treponémica (pruebas rápidas, TPPA)

Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

En cualquier consulta de atención prenatal

	Total
Porcentaje (%) : Cobertura de pruebas sobre sífilis en mujeres que recibieron servicios de atención prenatal (en cualquier visita)	0.9
Numerador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal y se realizaron las pruebas de la sífilis (en cualquier visita)	440
Denominador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	47470

En la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)

	Total
Porcentaje (%) : Cobertura de pruebas de sífilis en mujeres que recurren a servicios de atención prenatal en la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	78.1
Numerador : Número de mujeres que recurren a servicios de atención prenatal y que se sometieron a la prueba de sífilis durante la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	35221
Denominador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal.	45097

B. Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva

	Todo	15-24	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva.	0.9		
Numerador : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal con un resultado positivo para la sífilis.	420	231	189
Denominador : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal que se realizaron las pruebas de sífilis.	45097		

C. Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado	98.1
Numerador : Número de mujeres que recibieron servicios de atención prenatal que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis que recibieron como mínimo una dosis de penicilina benzatina 2,4 millones de unidades intramuscularmente	412
Denominador : Número de mujeres que recibieron servicios de atención prenatal que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis	420

2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos)

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Estudio especial

Otra herramienta/fuente de medición: Auditorías de casos con registro positivo en prueba treponémica y/o no treponémica en SIP y/o certificado de nacido vivo

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 31/12/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

¿Incluye su definición de casos para la sífilis congénita los partos de mortinatos?: Sí

Los países deben comentar si existen grandes diferencias entre la definición nacional de casos y la definición de casos de vigilancia mundial, disponible en la página 15 de:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)	0.2
Numerador : Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos) en los últimos 12 meses.	105
Denominador : Número de nacimientos	48915

3.1 Incidencia del VIH

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros

Otra herramienta/fuente de medición: DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EN SALUD

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

por sexo y edad

	15-49	50+	15-24	0-14	Todo
Incidencia : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas					
Numerador : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000					
Denominador : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)					

por sexo y edad

	Hombres (15-49)	Mujeres (15-49)	Hombres (50+)	Mujeres (50+)	Hombres (15-24)	Mujeres (15-24)
Incidencia : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas						
Numerador : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000						
Denominador : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)						

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)
---------------------	--	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)
--------	--	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---

3.2 Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave

A. Profesionales del sexo

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de los profesionales del sexo?: Sí

Año de la última estimación: 2016

Estimación del tamaño: 8195

Región para la cual se ha realizado la última estimación: Todo el país

Definición utilizada para la población: Persona adulta que en pleno ejercicio de sus facultades, sin coacción alguna de terceras personas, gana dinero u otra forma de retribución mediante el ofrecimiento de una práctica sexual. En el último año.

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño: Trabajadoras sexuales: 0.8% de mujeres entre 18 y 49 años + 5% de varones gays + 35.2% de trans (censo trans)

Comentarios: Trabajadoras sexuales mujeres: Como en la mayoría de los países, no existe una cifra exacta. Para el caso de Uruguay se aplica el 0,8% al total de mujeres comprendidas en el tramo 18-49 años de edad. Dicho porcentaje surge de estudios internacionales, y corresponde con el parámetro estándar que se viene utilizando en el país en el presente y en costeos anteriores. De esta manera se estima un total de 6212 trabajadoras. Trabajadores sexuales hombres: Se estima un total de 1.683 que se obtiene aplicando un 5% a la población estimada de HSH. Trabajadoras sexuales trans: Surge del censo de personas trans donde 35.2% declaró trabajo sexual actual de 853

Datos sub-nacionales - Profesionales del sexo:

Sitio/Ciudad	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
--------------	-----------------------------	-----------------------	--

B. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres?: Sí

Año de la última estimación: 2016

Estimación del tamaño: 33655

Región para la cual se ha realizado la última estimación: Todo el país

Definición utilizada para la población: Varón que se siente atraído afectiva y/o sexualmente por otros varones o por varones y mujeres. Alguna vez en la vida

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño: Estudios de estimaciones

Comentarios: La estimación se basa en trabajos de investigación internacionales y nacionales que arrojan cifras estimadas de HSH de 3% entre varones adultos.

Datos sub-nacionales - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres:

Sitio/Ciudad	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
--------------	-----------------------------	-----------------------	--

C. Usuarios de drogas inyectables

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de las personas que consumen drogas intravenosas?: No

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado la última estimación:

Definición utilizada para la población:

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:

Comentarios:

Datos sub-nacionales - Usuarios de drogas inyectables:

Sitio/Ciudad	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
--------------	-----------------------------	-----------------------	--

D. Personas transgénero

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de las personas transgénero?: Sí

Año de la última estimación: 2015

Estimación del tamaño: 853

Región para la cual se ha realizado la última estimación: Todo el país

Definición utilizada para la población: Persona a la que se le asignó un determinado género al momento del nacimiento, en relación con su sexo biológico, y que en el desarrollo de su vida se identifica con otro género. En el último año

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño: Censo

Comentarios:

Datos sub-nacionales - Personas transgénero:

Sitio/Ciudad	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
--------------	-----------------------------	-----------------------	--

E. Reclusos/detenidos

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de los presos?: Sí

Año de la última estimación: 2014

Estimación del tamaño: 10159

Región para la cual se ha realizado el último censo: Todo el país

Definición utilizada para la población: Personas que se encuentran bajo cualquier forma de detención, por orden de una autoridad, en razón de la comisión o presunta comisión de un delito o infracción de la ley, lo que les impide disponer de su libertad ambulatoria. En los últimos 3 meses

Comentarios: Datos del Ministerio del Interior

Datos sub-nacionales - Reclusos/detenidos:

Sitio/Ciudad	Año de la última estimación	Estimación del tamaño
--------------	-----------------------------	-----------------------

3.3A Prevalencia del VIH entre profesionales del sexo

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que vive con el VIH						
Numerador : Número de profesionales del sexo cuyo resultado en la prueba del VIH fue positivo						
Denominador : Número de profesionales del sexo que se realizó la prueba del VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.3B Prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que vive con el VIH			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con resultado positivo en la prueba del VIH			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se realizó la prueba del VIH			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

3.3C Prevalencia del VIH en personas que consumen drogas inyectables

Es el indicador/tema pertinente?: No

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que vive con el VIH						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que dieron positivo en las pruebas del VIH						
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables que se realizaron las pruebas del VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.3D Prevalencia del VIH entre las personas transgénero

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH						
Numerador : Número de personas transgénero con resultado positivo en las pruebas del VIH						
Denominador : Número de personas transgénero que se realizaron las pruebas del VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador
--------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

3.3E Prevalencia del VIH entre los presos

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición: Estudio epidemiológico en personas privadas de libertad

Desde la fecha: 05/03/2015

Hasta la fecha: 29/05/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. Se trabajó con un marco muestral formado por 37 centros penitenciarios. El diseño muestral fue multietápico estratificado por conglomerados donde las unidades primarias de muestreo (UPM) fueron los centros de reclusión y las unidades secundarias de muestreo (USM) fueron los internos/as, seleccionados por muestreo aleatorio sistemático. Se estudió una muestra de 832 personas privadas de libertad (PPL), en función del nivel de precisión definido (5%), con un nivel de confianza del 95%, para medir prevalencias esperadas cercanas al 10%, para los niveles de desagregación necesarios (por sexo, tramo etario), considerando una población de 10.000 personas privadas de libertad y una eventual tasa de no respuesta del 25%. Fueron provenientes de 18 Unidades de Internación de PPL, con sobre representación de mujeres y adolescentes. La recolección de los datos estuvo a cargo de médicos y enfermeros que integran los equipos de atención a la salud de las PPL, debidamente capacitados para el trabajo de campo, y supervisados por un integrante del equipo de investigación designado a tales efectos. Las entrevistas se desarrollaron entre el 15 de marzo y el 29 de mayo de 2015. Se utilizó un formulario diseñado en base a una adaptación del Instrumento STEPS v2.1, método "STEPwise" de la OMS para la vigilancia de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas, salud mental, salud bucal y lesiones; teniendo en cuenta las características específicas de la población, se incluyeron baterías de preguntas para evaluar agresiones, HIV, sífilis, tuberculosis, así como acceso a servicios de atención. Se complementó con un cuestionario auto-administrado, anónimo y confidencial que llenó el propio encuestado, a efectos de indagar cuestiones relativas al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, prácticas sexuales, riesgo de suicidio y barreras de acceso a la atención de urgencias. Se realizaron mediciones de presión arterial, peso y talla. Una vez obtenido el consentimiento informado se aplicaron test rápidos para tamizaje de VIH y sífilis, y para medición de glucemia y colesterolemia.

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de reclusos/detenidos que viven con el VIH	1.3	1.2	3.9			
Numerador : Número de reclusos/detenidos con resultado positivo en las pruebas del VIH	11	9	4			
Denominador : Número de reclusos/detenidos que se realizaron las pruebas del VIH	832	729	103			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.4A Conocimiento del estado serológico respecto del VIH entre profesionales del sexo

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que conocen su estado serológico respecto del VIH						
A : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de profesionales del sexo que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Última prueba: <6 meses	Última prueba: Hace entre 6 y 12 meses	Última prueba: >12 meses	resultado: positivo	resultado: negativo,	resultado: indeterminado
--------------	--	---	---	-------------------------	--	--------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

3.4B Conocimiento del estado serológico respecto del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que conocen su estado serológico respecto del VIH			
A : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo			
B : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo			
Numerador (A + B) : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que conocen su estado serológico respecto del VIH			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"			

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Última prueba: <6 meses	Última prueba: Hace entre 6 y 12 meses	Última prueba: >12 meses	resultado: positivo	resultado: negativo,	resultado: indeterminado
--------------	--	---	---	-------------------------	--	--------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

3.4C Conocimiento del estado serológico respecto del VIH entre las personas que consumen drogas inyectables

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas y que conocen su estado serológico respecto del VIH						
A : Número de personas que consumen drogas intravenosas que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de personas que consumen drogas intravenosas que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de personas que consumen drogas intravenosas y que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Última prueba: <6 meses	Última prueba: Hace entre 6 y 12 meses	Última prueba: >12 meses	resultado: positivo	resultado: negativo,	resultado: indeterminado

3.4D Conocimiento del estado serológico respecto del VIH entre las personas transgénero

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que conocen su estado serológico respecto del VIH						
A : Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de personas transgénero que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Última prueba: <6 meses	Última prueba: Hace entre 6 y 12 meses	Última prueba: >12 meses	resultado: positivo	resultado: negativo,	resultado: indeterminado
--------------	--	---	---	-------------------------	--	--------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

3.5A Cobertura de terapias antirretrovirales entre profesionales del sexo que viven con el VIH

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de encuestados que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.5B Cobertura de terapias antirretrovirales entre los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
Denominador : Número de encuestados que viven con el VIH			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador

3.5C Cobertura de terapias antirretrovirales entre personas que consumen drogas intravenosas y que viven con el VIH

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de encuestados que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.5D Cobertura de terapias antirretrovirales entre las personas transgénero que viven con el VIH

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de encuestados que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador
--------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

3.5E Cobertura de terapias antirretrovirales entre los presos que viven con el VIH

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de encuestados que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.6A Uso del preservativo entre los profesionales del sexo

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que declara haber utilizado un preservativo con su último cliente						
Numerador : Número de profesionales del sexo que declaró haber usado un preservativo con su último cliente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaró haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero en los últimos 12 meses						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.6B Uso del preservativo entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que declara haber utilizado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaró haber mantenido un coito anal con una pareja masculina en los últimos seis meses			

Datos sub-nacionales**Total y desglose por edad**

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

3.6C Uso del preservativo entre las personas que consumen drogas inyectables

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que afirma haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que afirmaron haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas y mantenido relaciones sexuales en el último mes						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.6D Uso del preservativo entre las personas transgénero

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que reportan haber utilizado el preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
Numerador : Número de personas transgénero que reportan haber utilizado el preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
Denominador : Número de personas transgénero encuestadas						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador
--------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

3.7A Cobertura de los programas de prevención del VIH entre profesionales del sexo

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de

salud sexual)

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron						

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual? (

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente a la pregunta ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual? "						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron						

Tabla D. Porcentaje de profesionales del sexo que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Numerador : Número de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron						

II. Datos de programas

	Valor de datos
Número de profesionales del sexo alcanzados por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo	
número de preservativos distribuidos entre profesionales del sexo	

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los profesionales del sexo

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
- Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
- Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.7B Cobertura de los programas de prevención del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron			

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron			

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual? (

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron			

Tabla D. Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron			

II. Datos de programas

	Valor de datos
Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres alcanzados por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo	
número de preservativos + lubricante distribuidos entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
- Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
- Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.7C Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas que consumen drogas intravenosas

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
Numerador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
Numerador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron						

Tabla C. ¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?"						
Numerador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron						

Tabla D. Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Numerador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Denominador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron						

II. Datos de programas

	Valor de datos
Número de personas que usan drogas inyectables alcanzadas por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo	
número de agujas y jeringuillas distribuidas entre personas que usan drogas inyectables	

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas que consumen drogas intravenosas

	Todo	TSO	Programas de agujas y jeringuillas
Número total de centros de prestación de servicios			
- Centros operados por el programa nacional (gobierno)			
- Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)			
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios			
Número total de áreas administrativas en el país			

3.7D Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas transgénero

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todo	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todo	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron						

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual? (

	Todo	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron						

Tabla D. Porcentaje de personas transgénero que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todo	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Numerador : Número de personas transgénero que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron						

II. Datos de programas

	Valor de datos
Número de personas transgénero alcanzados por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo	
Número de preservativos + lubricante distribuidos entre personas transgénero	

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas transgénero

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
- Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
- Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.8 Prácticas seguras en el consumo de drogas inyectables entre las personas que consumen drogas inyectables

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que afirma haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectó drogas						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectaron drogas						
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas en el último mes						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.9 Agujas y jeringuillas distribuidas por cada persona que consume drogas inyectables

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total
Indice : Número de agujas y jeringas distribuidas por usuario de drogas inyectables por año y por programa de agujas y jeringas	
Numerador : Número de agujas y jeringas distribuidas en los últimos 12 meses por los Planes Estratégicos Nacionales	
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables en el país	

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Años en los que se recopilan datos	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------------	------------------------------------	----------------	-----------	-------------

3.10 Cobertura de las terapias de sustitución de opiáceos

Es el indicador/tema pertinente?: No

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos en un momento determinado.						
Denominador : Número de personas que tienen dependencia de los opiáceos que usan drogas inyectables en el país						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición: Policlínica de atención a trabajadoras/es sexuales en Montevideo

Desde la fecha: 01/11/2016

Hasta la fecha: 01/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Registro de policlínica

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa	8			
Numerador : Número de profesionales del sexo que han tenido resultados positivos en pruebas de detección de sífilis activa	18			
Denominador : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas de detección de sífilis activa	224			

3.12 Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Estudio especial (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/04/2013

Hasta la fecha: 01/12/2013

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Bola de nieve. El estudio se realizó en 7 departamentos Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Maldonado, Montevideo y Rivera. Muestra final: 290

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos: El screening en relación a la sífilis- realizada con un test rápido- , el cual si bien permitió saber quiénes tuvieron sífilis en algún momento de su vida, no permite conocer la prevalencia de dicha enfermedad.

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa	21
Numerador : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que han recibido resultados positivos en pruebas para la detección de sífilis activa	61
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas para la detección de sífilis activa	290

3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Valor de datos
Número de agujas limpias distribuidas entre presos	
Número de presos que reciben terapias de sustitución de opiáceos	
Número de preservativos distribuidos entre presos	
Número de presos que reciben terapias antirretrovirales	
Numero de presos sometidos a pruebas sobre el VIH	

personas que viven con el VIH de entre los presos

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH de entre los presos	
Numerador : Número de personas que viven con el VIH de entre los presos	

Presos con hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que sufren hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	
Numerador : Número de presos que sufren hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	

Presos con TB o que presentan coinfección por VIH y TB

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	
Numerador : Número de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	

3.14 Hepatitis vírica entre grupos de población clave

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Hepatitis B

	Usuarios de drogas inyectables - Total	Usuarios de drogas inyectables - Hombres	Usuarios de drogas inyectables - Mujeres	Usuarios de drogas inyectables - Transgénero	Usuarios de drogas inyectables - <25	Usuarios de drogas inyectables - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero	Presos
Porcentaje (%) : Prevalencia de la hepatitis B y de la coinfección con el VIH entre grupos de población clave										
Numerador : Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en la prueba de antígeno de superficie de la hepatitis B y que también dan positivo en la prueba del VIH										
Denominador : Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis B										

Hepatitis C

Algoritmo de pruebas para la detección de la hepatitis C:

	Usuarios de drogas inyectables - Total	Usuarios de drogas inyectables - Hombres	Usuarios de drogas inyectables - Mujeres	Usuarios de drogas inyectables - Transgénero	Usuarios de drogas inyectables - <25	Usuarios de drogas inyectables - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero	Presos
Porcentaje (%) : Prevalencia de la hepatitis C y de la coinfección con el VIH entre grupos de población clave										
Numerador : Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en anticuerpos del virus de la hepatitis C y que también dan positivo en la prueba del VIH										
Denominador : Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis C										

3.15 Personas que reciben profilaxis previa a la exposición (PrEP)

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/04/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: La PrEP en Uruguay se dispensa en una clínica privada El costo lo asume el usuario Se inició en 2016

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Número de personas que recibieron profilaxis oral previa a la exposición durante el año natural

	Total	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido
Todo	4	4			
<15					
15-19					
20-24					
25-49					
50+					
Si no se dispone de desagregaciones por grupos de edad específica para edades de 15 años o más, facilite el número total de personas que recibieron PPrE de 15 años o más	4	4			
Edad desconocida					

Desagregación por grupo de población clave

	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Personas transgénero	Usuarios de drogas inyectables
Número de personas que recibieron profilaxis oral previa a la exposición durante el año natural	4	0	0	0

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	Transgénero

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Número de personas que recibieron profilaxis oral previa a la exposición durante el año natural

3.18 Uso del preservativo en la última relación sexual de alto riesgo

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : El porcentaje de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal, con la que no conviven, entre las personas que hayan mantenido relaciones sexuales con este tipo de pareja en los anteriores 12 meses									
Numerador : El número de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven.									
Denominador : Número total de encuestados que reportan haber mantenido relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven, en los anteriores doce meses.									

4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Respuestas "No" a la pregunta número 1 "¿Compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"

	Todo	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 1									

Herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 (si es diferente de la fuente de medición indicada más arriba):

Si la herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 es "otra", especifíquela:

Respuestas "No" a la pregunta número 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?"

	Todo	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 2									

Respondieron "No" a alguna pregunta

	Todo	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a cualquiera de las dos preguntas									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a cualquiera de las dos preguntas									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									

4.2A Evitación de los servicios para el VIH por parte de los profesional del sexo por causa del estigma y la discriminación

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de las pruebas del VIH

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron hacerse las pruebas del VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
Numerador : Número de profesionales del sexo que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaran no haberse hecho nunca las pruebas del VIH						

Evitación de la atención médica para el VIH

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<p>Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado</p>						
<p>Numerador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado</p>						
<p>Denominador : Número de profesionales del sexo que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH</p>						

Evitación del tratamiento para el VIH

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
Numerador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						

Datos específicos de ciudades

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
						Pruebas del VIH	

4.2B Evitación de los servicios para el VIH por parte de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres por causa del estigma y la discriminación

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de las pruebas del VIH

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron hacerse las pruebas del VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran no haberse hecho nunca las pruebas del VIH			

Evitación de la atención médica para el VIH

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH			

Evitación del tratamiento para el VIH

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recibir tratamiento para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH			

Datos específicos de ciudades

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
						Pruebas del VIH	

4.2C Evitación de los servicios para el VIH por parte de las personas que consumen drogas inyectables por causa del estigma y la discriminación

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de las pruebas del VIH

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que evitaron hacerse las pruebas del VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
Numerador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
Denominador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que declaran no haberse hecho nunca las pruebas del VIH						

Evitación de la atención médica para el VIH

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<p>Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado</p>						
<p>Numerador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado</p>						
<p>Denominador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH</p>						

Evitación del tratamiento para el VIH

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que viven con el VIH y que evitaron recibir tratamiento para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
Numerador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
Denominador : Número de personas que consumen drogas intravenosas que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						

Datos específicos de ciudades

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
						Pruebas del VIH	

4.2D Evitación de los servicios para el VIH por parte de las personas transgénero por causa del estigma y la discriminación

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de las pruebas del VIH

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que evitaron hacerse las pruebas del VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
Numerador : Número de personas transgénero que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
Denominador : Número de personas transgénero que declaran no haberse hecho nunca las pruebas del VIH			

Evitación de la atención médica para el VIH

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
Numerador : Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
Denominador : Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH			

Evitación del tratamiento para el VIH

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
Numerador : Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
Denominador : Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH			

Datos específicos de ciudades

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
						Pruebas del VIH	

4.3 Prevalencia de la violencia reciente por parte de una pareja íntima

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Prevalencia de la violencia por parte de un compañero sentimental

	Mujeres (todas las edades)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses				
Numerador : Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses				
Denominador : Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual				

Prevalencia de la violencia por parte de un compañero sentimental desagregada por estado del VIH

	Mujeres seropositivas	Mujeres seronegativas	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH	Mujeres seropositivas (15-19)	Mujeres seronegativas (15-19)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (15-19)	Mujeres seropositivas (20-24)	Mujeres seronegativas (20-24)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (20-24)	Mujeres seropositivas (25-49)	Mujeres seronegativas (25-49)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (25-49)
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses												
Numerador : Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses												
Denominador : Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual												

5.1 Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del VIH

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Respuestas correctas a las cinco preguntas

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
Numerador : Número de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Se puede reducir el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja no infectada que no tiene otras parejas?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 1							
Numerador : Numerador: número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 1							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 2: "¿Puede reducirse el riesgo de contraer el VIH usando preservativos cada vez que se mantienen relaciones sexuales?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 2							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 2							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 3: "¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 3							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 3							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 4: "¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito?" (u otra pregunta específica del país)

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 4							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 4							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 5: "Se puede contraer el VIH por compartir alimentos con una persona infectada?" (u otra pregunta específica del país)

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 5							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 5							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

5.2 Demanda de planificación familiar satisfecha mediante métodos modernos

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo (15-49)	15-19	20-24	25-49
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres en edad reproductiva (de entre 15 y 49 años de edad) que han visto satisfechas sus demandas de servicios de planificación familiar con métodos modernos				
Numerador : Número de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que utilizan métodos anticonceptivos modernos				
Denominador : Número total de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen una demanda para planificación familiar				

8.1A-H Gasto Total relativo al VIH (según categorías de programas o de servicios y según fuentes de financiación)

Click [here](#) to use the online tool to submit HIV expenditures.

Alternativamente, puede descargar la Matriz de Financiamiento Nacional vacía: [GAM 8-1 es.xlsx](#)

Complete la Matriz de Financiamiento Nacional y envíe el formulario final a aidsspending@unaids.org

10.1 Terapia combinada de la infección por el VIH y la tuberculosis

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Registros sobre pacientes con tuberculosis

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 31/12/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
Numerador : Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte	80	61	19		

Nota: la OMS calcula las estimaciones anuales del número de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH. Las estimaciones del denominador de 2016, facilitadas por los países sobre la notificación y la cobertura del tratamiento antirretrovírico, solo están disponibles desde agosto del año de notificación y no es necesario incluirlas en el momento de presentar los informes. Las estimaciones de 2015 se pueden consultar en: <http://www.who.int/tb/country/data/download/en/>

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Numerador
--------	-----------

10.2 Proporción de personas que viven con el VIH registradas por primera vez en la atención para el VIH con TB activa

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos para numerador y denominador)

Otra herramienta/fuente de medición: Numerador: Programa Nacional de TB Denominador: encuesta de inicios de tratamientos del Programa No se tiene el dato de pacientes sin TARV que se registraron en atención en el año

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 31/12/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Número total de personas seropositivas con tuberculosis activa, expresado como el porcentaje de los pacientes que se registran por primera vez en la atención para el VIH (terapia antirretrovírica o tratamiento previo) durante el periodo de notificación	2.9
Numerador : Número total de personas con tuberculosis activa durante el periodo de notificación entre quienes se registraron por primera vez en la atención para el VIH.	20
Denominador : Número total de personas que se inscribieron por primera vez en la atención para el VIH durante el periodo de notificación (tratamiento antirretrovírico más tratamiento previo). El denominador debe ser el mismo que el denominador del indicador 10.3	700

10.3 Proporción de personas que viven con el VIH registradas por primera vez en la atención para el VIH que iniciaron terapia preventiva para TB

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Número de pacientes que comenzaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente, expresado como el porcentaje del número total de personas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH durante el periodo de notificación	
Numerador : Número total de personas seropositivas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH e iniciaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente durante el periodo de notificación.	
Denominador : Número total de personas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH, es decir, quienes comenzaron la terapia antirretrovírica o el tratamiento previo a esta durante el periodo de notificación. El denominador debe ser el mismo que el denominador del indicador 10.2	

10.4 Hombres con secreción uretral

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres con secreción uretral en los últimos 12 meses	
Numerador : Número de hombres con secreción uretral durante el periodo de notificación.	
Denominador : Número de hombres con 15 o más años de edad.	

10.5 Gonorrea entre la población masculina

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total
Índice : Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos	
Numerador : Número de hombres que reportan gonorrea diagnosticados en laboratorio en los anteriores 12 meses	
Denominador : Número de hombres de 15 años de edad o más	

10.6 Pruebas de hepatitis B

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Usuarios de drogas inyectables
Porcentaje (%) : Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección de la hepatitis B						
Numerador : Número de personas que iniciaron terapias antirretrovirales que fueron sometidas a pruebas de hepatitis B durante el período del que se informa utilizando pruebas de antígeno de superficie de la hepatitis B						
Denominador : Número de personas que empiezan terapias antirretrovirales durante el período sobre el que se informa						

10.7 Proporción de personas coinfectadas con el VIH y el VHB que reciben terapia combinada

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Usuarios de drogas inyectables
Porcentaje (%) : Proporción de personas coinfectadas por VIH/VHB que reciben terapia combinada		
Numerador : Número de personas coinfectadas por el VIH y el VHB que reciben antirretrovíricos efectivos contra ambos virus durante el periodo de notificación.		
Denominador : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHB que reciben atención para el VIH durante un periodo de notificación (12 meses).		

10.8 Pruebas de hepatitis C

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Usuarios de drogas inyectables
Porcentaje (%) : Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección del virus de la hepatitis C (VHC)						
Numerador : Número de adultos y niños que inician terapias antirretrovirales que fueron sometidas a pruebas para la hepatitis C durante el periodo del que se informa utilizando la secuencia de pruebas sobre anticuerpos anti-VHC seguidas de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa a VHC para quienes sean anti-VHC-positivos.						
Denominador : Número de adultos y niños que empiezan terapias antirretrovirales durante el periodo sobre el que se informa						

10.9 Proporción de personas coinfectadas con el VIH y el VHC que inician tratamiento para el VHC

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Usuarios de drogas inyectables
Porcentaje (%) : Proporción de personas diagnosticadas con coinfección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC		
Numerador : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHC que iniciaron el tratamiento del VHC durante un periodo de tiempo determinado (por ejemplo, 12 meses)		
Denominador : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHC que recibieron atención para el VIH en un periodo de tiempo determinado (12 meses)		

10.10 Cáncer de cuello de útero entre las mujeres que viven con el VIH

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	30-49	Residencia: Urbana	Residencia: Rural
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres que viven con el VIH de entre 30 y 49 años de edad que comunican haber sido sometidas a pruebas de detección de cáncer de cuello de útero utilizando alguno de los siguientes métodos médicos: inspección con ácido acético o vinagre (VIA, por sus siglas en inglés), citología vaginal o prueba sobre el virus del papiloma humano (VPH)			
Numerador : Número de mujeres que viven con el VIH de entre 30 y 49 años de edad que dan cuenta de haberse sometido a una prueba de detección del cáncer de cuello de útero en que se haya utilizado alguno de los siguientes métodos: VIA, citología vaginal o prueba para el VPH.			
Denominador : Todas las mujeres encuestadas que viven con el VIH de entre 30 y 49 años de edad.			

i Encabezamiento

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 02/02/2017

Hasta la fecha: 29/03/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Se distribuyó por vía electrónica el formulario a los integrantes Gubernamentales, Academia, representantes de servicios asistenciales Entre quienes respondieron, se realizó una validación

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: Se distribuyó por vía electrónica el formulario a los integrantes Gubernamentales, Academia, representantes de servicios asistenciales Entre quienes respondieron, se realizó una validación

Descargar este formato: [Cuestionario del ICPN \(PDF\)](#)

Describe el proceso utilizado para recopilar y validar los datos del ICPN:

ICPN - PARTE A [para que respondan los funcionarios gubernamentales]

Nombres	Correo electrónico	Organización	Cargo	Tipo de parte interesada	Comentarios
Susana Cabrera	scabrera@msp.gub.uy	Área Programática ITS-VIH/Sida	Responsable Programa ITS-VIH/Sida	Otros, especificar en Comentarios	
Estela De Armas	esteladearmas@gmail.com	Área Programática Violencia	Asesora	Ministerio de Salud	
Rafael Aguirre	raguirre@msp.gub.uy	Área Programática SSyR	Responsable Salud Mujer	Ministerio de Salud	
Cristina Espasandín	cespasandin@msp.gub.uy	Área Programática SSyR	Asesora en Educación Sexual	Ministerio de Salud	
Andrés Bálamo	balsamoandres@gmail.com	Departamento de Vigilancia en Salud	Vigilancia ITS-VIH	Ministerio de Salud	
Zaida Arteta	zaidarteta@gmail.com	INFOCUS	Directora Técnica	Ministerio de Salud	INFOCUS Clínica de Enfermedades Infecciosas
Stella Guitérrez	maressol@chasque.net	ASSE. Policlínica materno-infantil de VIH	Directora	Ministerio de Salud	Servicio de subsector público de salud
Virginia González	vickygc21@gmail.com	ASSE. Policlínica materno-infantil VIH	Médico	Ministerio de Salud	Servicio de salud de subsector público
Juan Meré	mere@unfpa.org	UNFPA	Asesor VIH/Sida	Otra entidad de las Naciones Unidas	
Fernando Arrieta	drfernando.arrieta@gmail.com	PN TB	Coordinador General	Ministerio de Salud	
				Ministerio de Salud	
				Ministerio de Salud	
				Ministerio de Salud	

ICPN - PARTE B [para que respondan los representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos bilaterales y organizaciones de las Naciones Unidas]

Nombres	Organización	Organización	Papel	Entrevistados en la Parte A	Comentarios
				Ministerio de Salud	
				Ministerio de Salud	
				Ministerio de Salud	
				Ministerio de Salud	
				Ministerio de Salud	
				Ministerio de Salud	
				Ministerio de Salud	

Part A debe ser cumplimentado por las autoridades nacionales

A.1 Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

Pruebas sobre VIH

1. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enfoques en cuanto a pruebas sobre VIH se utilizan en su país (seleccionar todas las opciones que correspondan)?:: Pruebas y asesoramiento iniciados por el cliente, Pruebas y asesoramiento iniciados por el proveedor, Pruebas prenatales rutinarias

2. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la OMS 2015 sobre los servicios de pruebas sobre VIH en un procedimiento nacional sobre directrices para este tipo de pruebas?: Sí, parcialmente

3. ¿Ha adoptado o incluido su país pruebas autodiagnósticas de VIH como política o plan nacional?: No

3.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿están implementadas las pruebas autodiagnósticas sobre VIH?: No

3.2 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir esas pruebas autodiagnósticas en su política de actuación nacional en el futuro?: Sí

3.2.a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluyan las pruebas autodiagnósticas:: No hay un año previsto

4. ¿Ha incluido su país la notificación asistida a parejas en su política nacional?: No

4.1 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir la notificación asistida a parejas en su política nacional en el futuro?: Sí

4.1.a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluya esa notificación asistida a parejas:: No hay un año previsto

5. ¿Cuenta su país con una política de actuación que establezca que las pruebas sobre el VIH se facilitarán:: De forma gratuita para algunas personas

6. ¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH:

a) Se realizan únicamente sobre la base del consentimiento informado y voluntario: Sí

b) Son obligatorias antes del matrimonio: No

c) Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o de residencia: No

d) Son obligatorias para ciertos grupos: Sí

d.i. Si la respuesta es afirmativa, especifíquese esos grupos: Militares

7. ¿Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH e inclusión en servicios de atención sanitaria?: Sí

7.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen (seleccionar todas las opciones que correspondan):: Intervenciones racionalizadas (vinculación potenciada, revelación, rastreamiento)?, Enfoques basados en apoyo de pares y navegación para pacientes?, Enfoques de optimización de la calidad?

Si son otros, especifique:

Terapia antirretroviral

8. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH para 2016 de la OMS en un procedimiento nacional en?:

a) Directrices sobre terapia antirretroviral para adultos: en curso

Si es de otra manera, descríbala:

b) Directrices sobre PTMI: sí, completado

Si es de otra manera, descríbala:

c) Directrices sobre terapias antirretroviral pediátrica: en curso

Si es de otra manera, descríbala:

d) Directrices operativas / de prestación de servicios: en curso

Si es de otra manera, descríbala:

Mes y año en que las directrices sobre terapia antirretroviral se revisaron por última vez:

Mes: noviembre

Año: 2014, 2016 Primer Nivel de Atención

Favor cargar una copia de directrices nacionales actualizadas que estén disponibles.

9. ¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapias antirretrovirales en adultos y adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud?: TRATAMIENTO UNIVERSAL independientemente del recuento de células CD4

De ser otra, sírvase indicarla:

9.1 ¿Cuál es la situación de implementación del umbral de CD4 seleccionado más arriba?: Implementado en muchos (>50%) de los centros de tratamiento

De ser otra, sírvase indicarla:

9.2 Si su país no ha adoptado todavía una política de TRATAMIENTO UNIVERSAL, de conformidad con las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH , ¿existe un plan para avanzar hacia la adopción e implementación de una política de TRATAMIENTO UNIVERSAL en el futuro?:

9.2a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está previsto que se implemente el TRATAMIENTO UNIVERSAL?:

10. ¿Cuenta su país con tecnología de pruebas de CD4 en el punto de atención?: No

11. ¿Qué porcentaje (estimado) de centros primarios de asistencia sanitaria de su país tienen acceso a alguna forma de pruebas de recuento de célula CD4 para sus pacientes, ya sea in situ o mediante remisión médica a centros cercanos?: 20

12. ¿Las directrices nacionales de su país recomiendan la terapia antirretroviral (seleccionar todas las opciones que correspondan): Para todas las personas que viven con el VIH con TB activa, Para todas las personas que viven con el VIH con hepatitis B y enfermedad hepática grave, Para el miembro seropositivo de la pareja en parejas serodiscordantes, Para las personas que viven con el VIH identificadas como pertenecientes a grupos de población clave, independientemente de su recuento de células CD4

De ser otra, sírvase indicarla:

13. ¿Está permitido en su país terapias antirretroviral iniciada por personal de enfermería para alguno de los siguientes grupos de población? (seleccionar todas las opciones que correspondan):

14. ¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antirretroviral?: No

14.1 Si la respuesta es afirmativa, especificar qué enfoques se siguen para comunitaria de terapia antirretroviral:

15. ¿Se provee en su país terapia antirretroviral en entornos comunitarios (como afuera de instalaciones de salud) para las personas que se hallan estables en su terapia antirretroviral?: No

15.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?:

De ser otra, sírvase indicarla:

16. ¿Tiene su país una política de actuación nacional sobre priorización de personas con cuadros avanzados de enfermedad por VIH?: Sí

17. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para las personas que muestran situaciones estables en su terapia antirretroviral?: Sí

17.1 Si la respuesta es afirmativa, especifíquese la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política nacional:: Cada 6 meses

18. ¿Tiene su país una política nacional sobre el nivel de frecuencia con que las personas que tienen una situación estable en su terapia antirretroviral deberán recoger medicamentos antirretrovirales?: Sí

18.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de las recogidas de medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional:: Cada 3 meses

19. ¿Cuál o cuáles de las siguientes modalidades de provisión de servicios se incluyen en la política nacional sobre terapia antirretroviral para adultos, adolescentes y niños (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Los proveedores de servicios para madres, recién nacidos y niños ofrecen terapia antirretroviral en centros sanitarios de atención para madres, recién nacidos y niños, Servicios de asesoramiento y apoyo nutricional provistos para personas que viven con el VIH que presentan cuadros de malnutrición, Los proveedores de atención sanitaria primaria proveen terapia antirretroviral en entornos de atención sanitaria primaria, Apoyo para el paciente, Los proveedores de terapias antirretrovirales llevan a cabo pruebas de detección y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, Los proveedores de terapias antirretrovirales llevan a cabo pruebas de detección sobre salud mental y su tratamiento

De ser otra, sírvase indicarla:

Regímenes de terapia antirretroviral

Adultos y adolescentes

20. ¿Son TDF/3TC o (FTC)/EFV las combinaciones de antirretrovirales de primera línea de preferencia en las directrices nacionales para la iniciación de tratamientos entre...?

a) Adultos y adolescentes: Sí

De ser otra, sírvase indicarla:

a.i. Si no es así, ¿se está introduciendo DTG como el régimen antirretroviral de primera línea en su país?: Sí

b) Mujeres embarazadas: No

De ser otra, sírvase indicarla: AZT/3TC + LPV/r o TDF/3TC + LPV/r

21. ¿Utiliza su país combinaciones de terapia antirretroviral combinada con dosis fijas (FDC, en inglés) como la terapia antirretroviral de primera línea de preferencia? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Sí, combinación de dosis fija de 3 medicamentos suministrados una vez al día, Sí, combinación de dosis fija de 2 medicamentos + 1 medicamento diferente

De ser otra, sírvase indicarla: No disponible ampliamente por costos

22. ¿Es AZT/3TC (o FTC)/ATV/r (o LPV/r) la combinación de antirretrovirales de segunda línea de preferencia para adultos y adolescentes que viven con el VIH en las directrices nacionales?: Sí

De ser otra, sírvase indicarla: El cambio se realiza por test de resistencia

Niños

23. ¿Cuál es el inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa (INTI) de preferencia para la iniciación del tratamiento en niños menores de 3 años que viven con el VIH?: Zidovudina (AZT)

De ser otra, sírvase indicarla:

24. ¿Son los regímenes basados en LPV/r la opción de tratamiento de preferencia para todos los recién nacidos y niños de menos de 36 meses de edad que viven con el VIH (independientemente de su exposición a INNTI) en las directrices nacionales?: Sí, para todos

25. ¿Se recomienda efavirenz (EFV) como INNTI de preferencia para la iniciación del tratamiento en niños de 3 o más años de edad?: Sí

De ser otra, sírvase indicarla:

26. ¿Cuál es la piedra angular en INTI para la iniciación del tratamiento en niños de entre 3 y 10 años en las directrices nacionales?: AZT + 3TC (o FTC)

De ser otra, sírvase indicarla:

27. ¿Cuál es la piedra angular en INTI para la iniciación del tratamiento en niños de más 35 kg de peso y de más de 10 años de edad en las directrices nacionales?: AZT + 3TC (o FTC)

De ser otra, sírvase indicarla:

Carga viral

28. ¿Tiene su país una actual política nacional sobre pruebas de de carga viral de rutina para la vigilancia la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política?

a) Para adultos y adolescentes: Sí, plenamente implementada

b) Para niños: Sí, plenamente implementada

28.1 Si su país tiene una política nacional sobre pruebas de carga viral de rutina, ¿cuál es la frecuencia que se recomienda en esa política para las pruebas sobre supresión de carga viral?: Episódica

De ser otra, sírvase indicarla: Cada 6 meses

29. ¿En qué lugares están disponibles actualmente en su país pruebas de carga viral?: Están disponibles en centros sanitarios que proveen terapias antirretrovirales, ya sea in situ o mediante remisión médica

De ser otra, sírvase indicarla:

29.1 Si en las instalaciones sanitarias que ofrecen terapia antirretroviral de su país están disponibles pruebas de carga viral, favor estimar el porcentaje de esas instalaciones que tienen disponibles pruebas de carga viral: 20

30. ¿Hay pruebas de carga viral en puntos de atención en alguna instalación sanitaria de su país?: No

31. ¿Tiene su país una política para priorizar las pruebas de carga viral entre grupos de población y/o situaciones seleccionadas (es decir, mujeres embarazadas, recién nacidos, adolescentes)?: No

31.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?:

Resistencia a medicamentos para el VIH

32. ¿Cuenta su país con sistemas en vigor para monitorearla resistencia a medicamentos antirretrovirales?: No

33. En los tres últimos años, ¿ha llevado su país a cabo vigilancia sobre resistencia a medicamentos para el VIH de acuerdo con los siguientes protocolos de la OMS?:

a) Encuestas sobre resistencia a medicamentos de pretratamiento: No

a.i. Si la respuesta es afirmativa, especificar:

	Valor de datos
Año en que se inició por última vez	
Número de clínicas estudiadas	
Número de pacientes participantes en la encuesta	

b) Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos:

b.i. Si la respuesta es afirmativa, especificar:

	Valor de datos
Año en que se inició por última vez	
Número de clínicas estudiadas	
Número de pacientes participantes en la encuesta	

c) Encuestas sobre resistencia a medicamentos adquirida entre niños: Sí

c.i. Si la respuesta es afirmativa, especificar:

	Valor de datos
Año en que se inició por última vez	2016
Número de clínicas estudiadas	4
Número de pacientes participantes en la encuesta	10

d) Resistencia a medicamentos para el VIH entre bebés (<18 meses) utilizando diagnóstico infantil temprano: Sí

d.i. Si la respuesta es afirmativa, especificar

	Valor de datos
Año en que se inició por última vez	2016
Número de clínicas estudiadas	2
Número de pacientes participantes en la encuesta	2

e) Encuestas o monitoreo de rutina de rendimiento clínico utilizando indicadores de alerta temprana sobre resistencia a medicamentos para el VIH: No

e.i. Si la respuesta es afirmativa, especificar:

	Valor de datos
Año en que se inició por última vez	
Número de clínicas estudiadas	

34. Excluyendo enfoques de farmacovigilancia pasiva, ¿realiza su país esfuerzos sistemáticos continuados para supervisar en el país la toxicidad de medicamentos antirretrovirales?: No

34.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan? (seleccionar todas las opciones que correspondan)::

Adherencia y retención

35. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre apoyo a la adherencia?: Sí

35.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen (seleccionar todas las opciones que correspondan):: Mensajes de texto, Uso de dispositivos recordatorios, Terapia cognitivo-conductual, Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria

De ser otra, sírvase indicarla:

36. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre retención en terapia antirretroviral?: Sí

36.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen (seleccionar todas las opciones que correspondan):: Asociaciones de adherencia terapéutica y apoyo entre pares

De ser otra, sírvase indicarla:

37. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes de apoyo a la adherencia en su país? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Consejería de pares, Mensajes de texto, Uso de dispositivos recordatorios, Terapia cognitivo-conductual, Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria

De ser otra, sírvase indicarla:

38. ¿Hay disponibles en su país programas de alfabetización terapéutica para las personas que viven con el VIH, incluida información sobre efectos secundarios, resistencia a medicamentos, etc.?: No

ADPIC

39. ¿Qué flexibilidades* de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio relativos a la salud pública están incorporadas en la legislación nacional de su país sobre propiedad industrial y/o intelectual, y cuáles se han utilizado para favorecer el acceso a productos relacionados con el VIH y/o a otros productos sanitarios?

	¿Están incorporadas en la legislación nacional sobre propiedad industrial/intelectual?	Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se utilizaron por última vez?	Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué productos médicos se han utilizado?
--	--	--	--

A.2 Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018

Prevención de la transmisión materno-infantil del VIH

40. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión materno-infantil (PTMI) del VIH?: Sí

40.1 Si la respuesta es afirmativa, especificar:

	Valor de datos
Meta(s) sobre tasa de transmisión materno-infantil	<2
Año	2018

	Valor de datos
Meta(s) de eliminación (como es el número casos / población)	2
Año	2018

41. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda nacionalmente para la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud?: Tratamiento Universal para las mujeres embarazadas / mujeres lactantes para toda la vida

Otro, especificar régimen: :

41.1 Si su país está aplicando la política de TRATAMIENTO UNIVERSAL para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que viven con el VIH, ¿de qué forma se está implementando?: Implementado en todo el país

42. ¿Cuál es el régimen de terapia antirretroviral de primera línea que se recomienda nacionalmente para mujeres embarazadas y mujeres lactantes que viven con el VIH?: Otro

Otro (especificar): AZT (o TDF)/3TC (FTC) + LPV/r

43. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda nacionalmente para la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH para recién nacidos expuestos al VIH?

a) Especifíquese el régimen de profilaxis para recién nacidos: AZT

b) Duración recomendada del régimen: 6 semanas

44. ¿Cuenta su país con una recomendación nacional sobre alimentación infantil para recién nacidos expuestos al VIH?: Sí, alimentación de sustitución

44.1 Si se recomienda la lactancia para mujeres VIH-positivas y recién nacidos expuestos al VIH, ¿está especificada su duración recomendada?: No

Sí (especificar la duración en meses):

45. ¿Está el apoyo alimentario y nutricional integrado en su país con programas PTMI?: Implementado en todo el país

46. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional sobre intervenciones en el parto de mujeres que viven con el VIH que no han recibido previamente la prueba?: Sí, plenamente implementada

47. ¿Está la transmisión vertical del VIH criminalizada en su país?: No

Eliminación de la transmisión meternoinfantil de la sífilis

48. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis?: Sí, integrado con iniciativas sobre el VIH o con otras iniciativas de eliminación

49. ¿Cuenta su país con una política nacional de actuación para la detección rutinaria de la sífilis entre mujeres embarazadas?: Sí

49.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipos de pruebas se utilizan?: Pruebas de laboratorio no treponemales (como son RPR/VDRL)

Diagnóstico temprano en los recién nacidos

50. ¿En qué momento recomiendan las directrices nacionales de su país que los bebés sean sometidos a pruebas para la detección del VIH (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: En el momento del nacimiento, 2 meses, 6 meses, 18 meses

51. Además de los entornos PTMI, ¿algunos de los siguientes centros realiza la prueba de VIH para niños? (seleccionar todas las opciones que correspondan):

Otro, especificar :

52. ¿Cuenta su país con una política para ofrecer pruebas de ácido nucleico para niños expuestos al VIH (diagnóstico infantil temprano, RCP ADN) en el momento del nacimiento?: Sí

53. ¿Son sometidos los niños expuestos al VIH a pruebas de anticuerpos del VIH a los nueve meses?: No

54. ¿Está implementándose en su país una prueba final de anticuerpos del VIH a los 18 meses de edad o transcurridos tres meses del final del periodo de lactancia?: Sí

55. ¿Cuenta su país con una política o recomendaciones para pruebas de carga viral en puntos de atención sanitaria?: No

55.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?:

Participación comunitaria en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

56. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están proveyendo servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) en el país?: 44

¿Cuántas instalaciones sanitarias que proveen servicios PTMI tienen en vigor mecanismos de rendición de cuentas comunitaria"?: 0

57. ¿Existen intervenciones dirigidas para garantizar que las siguientes consideraciones relativas a los derechos humanos reciben respuesta como parte de programas sobre PTMI? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Consentimiento libre e informado como única base para las pruebas y/o tratamiento para el VIH, Consentimiento libre e informado como única base para la provisión de abortos, anticonceptivos y/o esterilización de mujeres que viven con el VIH, Confidencialidad y privacidad, Prevención de abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos* como parte de programas PTMI, Actuaciones de diligencia debida para dar respuesta a los casos de violaciones de los derechos humanos como parte de programas PTMI

58. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los últimos doce meses?: Sí

58.1 Si la respuesta es afirmativa:

- a) ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de revisión nacional?: Sí
- b) ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil de ofrecer sus comentarios?: Sí
- c) ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática?: Sí
- d) ¿Esos análisis provistos por las comunidades y la sociedad civil se documentó y difundió tras esa reunión?: No
- e) ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relativas a PTMI?: No

Antirretrovirales para niños

59. ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que viven con el VIH independientemente de los síntomas que presenten?: Tratamiento universal

Otro, especificar:

59.1. ¿Cuál es en su país la situación de implementación de la política sobre edad de corte?: Implementado en todo el país

Otro, especificar:

60. ¿Cuándo se considera en su país que se ha perdido el seguimiento de un niño que haya iniciado terapia antirretroviral?: Cuando no ha sido visto en los servicios de atención para el VIH o en recogidas de medicamentos en farmacia durante 3 meses

61. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan para garantizar que no se pierda el seguimiento de adolescentes nacidos con el VIH cuando pasan a ser incluidos en la atención sobre VIH para adultos?: Sí

62. ¿Se monitorean las cohortes de niños que reciben terapias antirretrovirales (por ejemplo, cerciorándose de que esos niños siguen vivos y que están recibiendo terapia antirretroviral) en los registros nacionales a intervalos de 6 y 12 meses?: Sí

¿Están los programas de monitoreo del crecimiento y nutricionales para niños integrados en su país con las pruebas y el tratamiento para el VIH?: Implementado en pocos (<50%) centros de tratamiento

A.3 Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y los presos)

64. ¿Han sido incluidas las Directrices consolidadas sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y atención para el VIH de la OMS 2016 para grupos de población clave en la política nacional o en los planes nacionales sobre VIH?: Sí, parcialmente

Legislación

65. ¿Están criminalizadas o perseguidas legalmente las personas transgénero?: No están criminalizadas ni son perseguidas legalmente

66. ¿Está el travestismo criminalizado en su país?: No

67. ¿Está criminalizado el trabajo sexual en su país?: El trabajo sexual no está sometido a regulaciones sancionadoras o no está criminalizado

68. ¿Tiene su país leyes que criminalicen los actos sexuales entre personas del mismo sexo?: La legislación que penaliza los actos homosexuales ha sido despenalizada o nunca ha existido

69. ¿Su país retiene en la legislación la pena de muerte para delitos relacionados con drogas?: No

69.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es su nivel de aplicación?:

70. ¿Constituye una infracción sancionable en su país la posesión de drogas para uso personal?:

71. ¿Tiene su país otras normas legales punitivas que afecten a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales?: No

Protecciones legales para grupos de población clave

72. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para las personas transgénero (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Prohibiciones de la discriminación laboral basada en la diversidad de género, Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la diversidad de género

73. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para los profesionales del sexo (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: El trabajo sexual está reconocido como trabajo

74. ¿Tiene su país legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a la orientación sexual de las personas? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Están prohibidos los actos de incitación al odio basados en la orientación sexual de las personas, Prohibición de la discriminación laboral basada en la orientación sexual de las personas, Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación sexual de las personas

75. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación* u otras disposiciones que correspondan a las personas que consumen drogas?: No

76. ¿Existen referencias de apoyo explícitas en políticas nacionales sobre la reducción de daños?: No

76.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿abordan esas políticas nacionales las necesidades específicas de las mujeres que consumen drogas?: No

Prevención del VIH entre profesionales del sexo

77. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones entre los profesionales del sexo, y para la provisión de servicios entre los profesionales del sexo y sus clientes?: Sí

77.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional incluye...? (seleccionar todas las opciones que correspondan):: Empoderamiento y capacitación comunitarios para las organizaciones de profesionales del sexo, Distribución de preservativos para profesionales del sexo y sus clientes, Servicios clínicos para profesionales del sexo y sus clientes, Servicios de apoyo legal para profesionales del sexo, Actuaciones para dar respuesta a la violencia de género

78. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales sobre prevención del VIH para el año 2020?: No

78.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención entre profesionales del sexo y sus clientes para el año 2020?

Porcentaje de profesionales del sexo y sus clientes alcanzados por servicios de prevención del VIH::

Porcentaje de profesionales del sexo y sus clientes alcanzados por servicios de prevención del VIH:

	Valor de datos
Profesionales del sexo	
Clientes	

Prevención del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

79. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones y proveer servicios entre los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres?: Sí

79.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional para los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres incluye...?: Empoderamiento y capacitación comunitarios para organizaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Distribución de preservativos y lubricantes compatibles con preservativos, Servicios clínicos, Asesoramiento psicológico y/o servicios de salud mental

80. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2020?: No

80.1 Sí la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención para los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2020?

80.1 a) Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres:

80.1 b) Porcentaje de hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres alcanzados por programas de prevención:

Prevención del VIH para las personas que usan drogas inyectables

81. ¿Existen políticas nacionales que excluyen a las personas que estén consumiendo drogas de recibir terapias antirretrovirales?: No

82. ¿Hay programas de distribución de agujas y jeringuillas operativos en su país?: No, pero agujas y jeringuillas pueden adquirirse legalmente en farmacias, sin necesidad de prescripción médica

83. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas o jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país?: No

84. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos operativos en su país?: No

85. ¿Están implementadas en sus país intervenciones para el tratamiento de la drogodependencia aparte de las terapias de sustitución de opiáceos?: No

85.1 Si la respuesta es afirmativa, esas intervenciones son para::

86. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria?: No

87. ¿Existen espacios/salas para inyección segura de drogas?: No

87.1 Si la respuesta es afirmativa, especificar:

	Valor de datos
Número de espacios/salas	
Número de personas inscritas para su uso	

Servicios de prevención del VIH para presos

88. ¿Hay programas de distribución de agujas y jeringuillas operativos en las prisiones en su país?: No

89. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las prisiones?: No

90. ¿Están disponibles para los presos en su país preservativos y lubricantes?: Sí

91. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?:

a) con el consentimiento informado de los presos?: Sí

b) gratuitas?: Sí

c) confidenciales: Sí

d) disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad?: Sí

e) se acompañan de información relevante y accesible?: Sí

f) se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de las pruebas?: Sí

g) son accesibles por igual para todos los presos?: Sí

g.1 Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no disfrutan de ese acceso igualitario?:

92. ¿Está disponible en su país terapia antirretroviral para todos los presos que viven con el VIH?: Sí

Participación de los grupos de población clave en la respuesta nacional frente al sida

93. ¿Participan* los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí

94. ¿Participan* los profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí

95. ¿Participan* las personas que usan drogas inyectables en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: No

96. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí

97. ¿Participan* los ex-presos y la población actualmente reclusa en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí

Servicios para personas afectadas por emergencias humanitarias

98. ¿Son accesibles en su país los siguientes servicios para las personas afectadas por emergencias humanitarias? (para todas las personas afectadas por emergencias, entre ellas, sin exclusión de otras personas: personas no desplazadas, refugiados y solicitantes de asilo, desplazados internos y migrantes)

a) Asesoramiento y pruebas sobre el VIH: No aplicable

b) Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH: No aplicable

c) Tratamiento del VIH: No aplicable

d) Pruebas de detección y tratamiento para TB: No aplicable

e) Prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual: No aplicable

f) Servicios para grupos de población clave: No aplicable

g) Servicios para supervivientes de violencia sexual o de violencia de género*: No aplicable

h) Apoyo alimentario y nutricional: No aplicable

Profilaxis previa a la exposición (PrEP)

99. ¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país?: Sí

99.1 Si la profilaxis previa a la exposición está disponible en su país, ¿esa profilaxis se ofrece...? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Disponible a través de proveedores privados

99.2 Si está disponible la PrEP, especifíquese para qué personas e inclúyanse los criterios de elegibilidad aplicados para la provisión de PrEP?

Hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: Sí

Especificar los criterios de elegibilidad: Men who have sex frequently with unknown partners, in whom consistent condom use is not achieved

Profesionales del sexo: No

Especificar los criterios de elegibilidad:

Personas que usan drogas inyectables: No

Especificar los criterios de elegibilidad:

Personas transgénero: Sí

Especificar los criterios de elegibilidad: sex frequently with unknown partners, in whom consistent condom use is not achieved

Parejas serodiscordantes: No

Especificar los criterios de elegibilidad:

Mujeres jóvenes: No

Especificar los criterios de elegibilidad:

Otros: No

Otros: especificar:

Especificar los criterios de elegibilidad:

99.3 Si PrEP está disponible, ¿se ofrece un programa formativo sobre PrEP al personal sanitario?: No

99.4 Si la profilaxis previa a la exposición no está disponible en su país, eso es así porque... (seleccionar todas las opciones que correspondan): No existe ninguna política al respecto, No es una prioridad a efectos de financiación

Las preguntas 100-102 son sobre la circuncisión médica masculina voluntaria y están disponibles en una página aparte. Estas preguntas únicamente deberán ser contestadas por 16 países con alta prevalencia de VIH, bajos niveles de circuncisión masculina y epidemia heterosexual masculina generalizada: Botswana, Etiopía, República Centroafricana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sudáfrica, Sudán del Sur, Swazilandia, Uganda, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe.

Preservativos

103. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan en relación con el preservativo?: Sí

103.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe una estrategia o plan nacional sobre el preservativo que expresamente aborde las necesidades de y programas de preservativos dirigidos para las siguientes poblaciones? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Personas que viven con el VIH, Profesionales del sexo (hombres y mujeres), Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Personas que usan drogas inyectables, Jóvenes (15-24 años de edad), Personas con infecciones de transmisión sexual (ITS), Presos, El público general

103.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional sobre el preservativo incluye...? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Distribución gratuita entre grupos de población clave, Comercialización subvencionada de preservativos, Ventas del sector privado, Promoción del preservativo a través de los medios de comunicación, Promoción del preservativo en las escuelas (secundarias)

104. ¿Se han estimado las necesidades nacionales en cuanto a preservativos?: Sí

105. ¿Puede ser alguien procesado o castigado por portar preservativos en su país?: No

106. ¿Existen en su país restricciones de edad para el acceso a preservativos?: No

107. ¿Existen en su país restricciones sobre la distribución en lugares públicos de preservativos?: No

108. ¿Ha habido situaciones de desabastecimiento* de preservativos en los últimos 12 meses?

a) Situaciones de desabastecimiento de alcance nacional:: No

b) Situaciones de desabastecimiento de alcance local:: No

109. ¿Cuántos preservativos y lubricantes se distribuyeron (es decir, salieron de almacenes centrales o regionales para su subsiguiente distribución) en el anterior año calendario, según tipo de proveedor?

a) Preservativos masculinos:

	Valor de datos
Total	71500000
Público	64000000
Privado	7200000
ONG	300000

b) Preservativos femeninos:

	Valor de datos
Total	130000
Público	120000
Privado	5000
ONG	5000

c) Lubricantes:

	Valor de datos
Total	140000
Público	120000
Privado	0
ONG	20000

A.4 Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020

Violencia

110. ¿Tiene su país un plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género* y la violencia contra la mujer que incluye el VIH?: Sí

111. ¿Tiene su país legislación específica sobre violencia doméstica*?: Sí

111.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa legislación cubre...? (seleccionar todas las opciones que correspondan):: Violencia física, Violencia sexual, Violencia emocional, Violencia económica, Protección para excónyuges, Protección para parejas íntimas no casada

112. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones en su país en relación con violencia doméstica*? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Mandamientos judiciales para la protección de la seguridad de las supervivientes, Servicios de protección para supervivientes de actos de violencia doméstica, como son servicios legales o refugios, Servicios dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia

113. ¿Tiene su país sanciones penales específicas sobre violencia doméstica*?: Sí

113.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha habido procesos penales al respecto en los dos últimos años?: Sí

114. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH de la violencia? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Leyes penales

generales que prohíben actos de violencia, Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas íntimas*, Programas dirigidos a dar respuesta a actos de violencia en lugares de trabajo, Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso policial, Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de tortura y maltrato en las prisiones

115. ¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que ofrezcan los siguientes servicios de atención médica y psicológica para mujeres y hombres que hayan sido violados o sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la OMS 2013 Dar respuesta a la violencia ejercida por parejas íntimas y la violencia sexual contra la mujer?:

a) Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos: Sí

b) Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan servicios durante los cinco días siguientes: Sí

c) Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de conformidad con la legislación nacional al respecto: Sí

d) Profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH (dentro de las 72 horas siguientes a la agresión sexual), según sea necesaria: Sí

Matrimonio infantil

116. En su país, ¿cuál es la edad legal mínima para el matrimonio para (años de edad)?:

	a) Niñas	b) Niños
Edad	18	18

117. En su país, ¿está prohibido o carece de validez el matrimonio infantil (unión formal en matrimonio o unión informal antes de los 18 años de edad)?: Sí

Estigma y discriminación

118. ¿Tiene su país políticas en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico u otra condición sanitaria, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad o cualquier otra situación?: Sí, esas políticas existen y se implementan de forma sistemática

119. ¿Cuenta su país con intervenciones dirigidas a los profesionales sanitarios para formarles en competencias relativas a derechos humanos para dar respuesta al estigma y la discriminación, y a la violencia de género?: Sí, a pequeña escala

120. ¿Tiene su país legislación que criminalice la transmisión, no revelación o exposición a la transmisión del VIH?: No

121. ¿Tiene su país legislación o políticas que restrinjan la entrada, permanencia o residencia de las personas que viven con el VIH?: No

Consentimiento parental y conyugal para el acceso a servicios para el VIH

122. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva?: Sí, para adolescentes menores de 18 años

123. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a pruebas sobre el VIH?: No

124. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a tratamiento para el VIH?: No

125. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva?: No

126. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a la prueba de VIH?: No

Women, Business and the Law data are based on domestic laws and regulations and are updated every two years. The indicators are constructed based on responses from practitioners with expertise in family, labor and criminal law, including lawyers, judges, academics and members of civil society organizations working on gender issues. These data cover May 2013 to April 2015, were collected between September 2014 and April 2015 and are current as of April 2015. Women, Business and the Law requires each legal data point to have a citable legal source, and sources for every data point are posted on the project website (<http://wbl.worldbank.org>) to ensure that the data are transparent.

A.5 Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año

127. ¿Cuenta su país con políticas educativas que orienten el ofrecimiento de educación sobre VIH basada en capacidades generales para la vida y educación sobre sexualidad*, de acuerdo con estándares internacionales*, en...?

a) La escuela primaria: Sí

b) La escuela secundaria: Sí

c) La formación para profesores: Sí

128. ¿Participan* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí

128.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional al sida?: Autoridad coordinadora nacional sobre el sida u equivalente, con un mandato multisectorial amplio

Otro, especificar:

A.6 Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

129. ¿Tiene su país estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social* aprobados*?: Sí, y están siendo implementados

129.1 Si la respuesta es afirmativa:

a) ¿Hace referencia al VIH?: Sí

b) **¿Reconoce a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave?: Sí**

c) **¿Reconoce a grupos de población clave (profesionales del sexo, hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas inyectables, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave?: Sí**

d) **¿Reconoce a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave?: Sí**

e) **¿Reconocen a las personas afectadas por el VIH (niños y familiares) como beneficiarios clave?: Sí**

f) **¿Aborda la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH?: No**

130. **¿Están incluidos representantes del Programa Nacional sobre sida o de su equivalente en el mecanismo o plataforma de coordinación de protección social*?: Existe un mecanismo o plataforma de coordinación de la protección social e incluye a representantes del Programa Nacional sobre el Sida o de su equivalente**

131. **¿Hay implementados en el país programas de transferencias de efectivo* para mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años de edad?: Sí**

A.7 Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

132. **¿Existen en su país las siguientes salvaguardas en la legislación, regulaciones y políticas para la operación de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con el VIH, Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias que trabajen con grupos de población clave**

133. **¿Existe legislación, políticas o regulaciones que permitan el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias?: A través de donantes internacionales**

Otro, especificar:

A.9 Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

134. **En los dos últimos años, en su país, ¿han habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?: Sí, a escala, a nivel nacional**

135. **¿Cuenta su país con programas de formación para los siguientes grupos sobre derechos humanos y marcos legales sobre la no discriminación aplicables al VIH?**

a) **Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley: Sí, a pequeña escala**

b) **Para miembros del sistema judicial: No**

c) **Para funcionarios nombrados por elección popular (legisladores/parlamentarios): Sí, actividades puntuales**

d) **Para trabajadores sanitarios: Sí, a escala, a nivel subnacional**

136. ¿Cuenta su país con programas de formación sobre prevención de la violencia contra la mujer y de la violencia de género para los siguientes?

- a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley: Sí, a escala, a nivel nacional
- b) Para miembros del sistema judicial: Sí, a escala, a nivel nacional
- c) Para funcionarios nombrados por elección popular (legisladores/parlamentarios): Sí, a escala, a nivel nacional
- d) Para trabajadores sanitarios: Sí, a escala, a nivel nacional

137. ¿Algunos de los siguientes son obstáculos para la provisión de estos entrenamientos y/o actividades de capacitación (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Falta de voluntad política, Falta de financiación

138. ¿Hay mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave)?: Sí

Sí, favor describir: Comisión Honoraria contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación del Ministerio de Educación y Cultura. Dirección de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública. Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Comisión Nacional de Sida.

139. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario?: Procedimientos de reclamación, Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de los pacientes

140. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes sistemas de monitoreo y aplicación en materia de derechos humanos?

a) Existen instituciones nacionales funcionalmente independientes para la promoción y protección de los derechos humanos, entre ellas comisiones de derechos humanos, comisiones de reforma legislativa, órganos protectores, y defensores del pueblo que tengan entre sus competencias las cuestiones relacionadas con el VIH: Sí

b) Supervisión de la implementación de observaciones y recomendaciones finales de órganos encargados de monitorear la aplicación de los tratados y EPU: Sí

141. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a la justicia (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Sí, servicios legales provistos por centros jurídicos universitarios, Sí, servicios paralegales comunitarios

Sí, otros: describir:

A.10 Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

142. ¿En qué medida están integradas las instalaciones sanitarias que prestan servicios sobre VIH con otros servicios sanitarios de su país? (seleccione el nivel de integración para cada servicio)

- a) Asesoramiento y pruebas del VIH con la salud sexual y reproductiva: Plenamente integradas en todas las instalaciones sanitarias**
- b) Tratamiento y atención para el VIH con la salud sexual y reproductiva: Prestan servicios de forma separada**
- c) Asesoramiento y pruebas del VIH integrados con los servicios sobre TB: Plenamente integradas en todas las instalaciones sanitarias**
- d) Pruebas de detección de TB en servicios sobre VIH: Integradas en algunas instalaciones sanitarias**
- e) Tratamiento antirretroviral y tratamiento para TB: Integradas en algunas instalaciones sanitarias**
- f) Tratamiento para el VIH y para la hepatitis C: Integradas en algunas instalaciones sanitarias**
- g) Asesoramiento y pruebas del VIH y enfermedades crónicas no comunicables : Prestan servicios de forma separada**
- h) Antirretrovirales y enfermedades crónicas no comunicables: Prestan servicios de forma separada**
- i) Asesoramiento y pruebas del VIH y atención extrahospitalaria general: Integradas en algunas instalaciones sanitarias**
- j) Antirretrovirales y atención extrahospitalaria general: Plenamente integradas en todas las instalaciones sanitarias**
- k) Detección y mitigación de la violencia integradas en los servicios sobre VIH: Integradas en algunas instalaciones sanitarias**
- l) Asesoramiento y pruebas sobre el VIH integrados con pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero: Integradas en algunas instalaciones sanitarias**
- m) Pruebas de detección del cáncer de cuello de útero integradas en los servicios de VIH: Integradas en algunas instalaciones sanitarias**
- n) PTMI con servicios de atención prenatal y maternoinfantil: Plenamente integradas en todas las instalaciones sanitarias**
- o) Tratamiento y atención para el VIH con los servicios de apoyo nutricional: Integradas en algunas instalaciones sanitarias**
- p) Pruebas sobre el VIH integradas con servicios de atención infantil (incluido monitoreo del crecimiento, nutrición e inmunización): Prestan servicios de forma separada**
- q) Tratamiento y atención sobre el VIH integrados con servicios de atención sanitaria infantil (incluido monitoreo del crecimiento, nutrición e inmunización): Integradas en algunas instalaciones sanitarias**
- r) Servicios sobre el VIH y reducción de daños: Prestan servicios de forma separada**

Se recomiendan las pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero para mujeres que viven con el VIH en...?

- a. La estrategia, política, plan o directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al cáncer de cuello de útero o la respuesta, más amplia, a las enfermedades no comunicables: Sí**

El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida: Sí

Directrices nacionales sobre tratamiento para el VIH: Sí

144. ¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y niños (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Terapia preventiva con isoniacida o profilaxis para infecciones latentes de TB para las personas que viven con el VIH, Actuaciones intensificadas de búsqueda de casos de TB entre las personas que viven con el VIH, Control de infección por TB en entornos de atención sanitaria para el VIH, Profilaxis con cotrimoxazol, Detección de casos y gestión de la hepatitis B en centros sanitarios que proveen terapia antirretroviral, Detección de casos y gestión de la hepatitis C en centros sanitarios que proveen terapia antirretroviral, Vacunación para la hepatitis B provista en centros sanitarios que proveen terapia antirretroviral, Tratamiento para la hepatitis C (agentes antivirales de acción directa) provisto en centros sanitarios que proveen terapia antirretrovira

Otro, especificar:

Infecciones de transmisión sexual (ITS)

145. ¿Cuenta su país con directrices o recomendaciones nacionales sobre tratamiento de ITS?: Sí

145.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se actualizaron por última vez?: 2016

146. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan de acción nacional para la prevención y control de ITS?:

147. ¿Se realizan en su país actuaciones de monitoreo sobre resistencia a antimicrobianos gonocócicos?: Sí, anualmente

148. ¿Incluye la definición nacional de la sífilis congénita los partos de mortinatos?: Sí

Estrategia nacional sobre VIH y monitoreo y evaluación

Estrategia

149. ¿Cuenta su país con una estrategia o política que oriente su respuesta al sida?: Sí, una estrategia o política de salud que integra la respuesta al sida

Otro, especificar:

149.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha sido revisada en los dos últimos años esa estrategia o política sobre el sida?: Sí

149.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política que orienta la respuesta al sida aborda de forma expresa los siguientes grupos de población clave o grupos de población vulnerable? (seleccionar todas las opciones que correspondan):: Grupos clave de población adolescente, Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Presos y otras personas privadas de libertad, Profesionales del sexo (hombres y mujeres), Personas transgénero

149.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política que orienta la respuesta al sida...? (seleccionar todas las opciones que correspondan):: Incluye de forma específica planes o actividades explícitos que abordan las necesidades de los grupos de población clave, Incluye de forma específica planes o actividades explícitos que abordan las necesidades de las niñas y mujeres jóvenes, Se basa en la evidencia más reciente sobre la epidemia nacional de VIH y en la situación de la respuesta nacional frente al sida, Integra aportaciones a través de un proceso multisectorial, que incluye a diversos sectores del gobierno, y también a socios no gubernamentales

149.4 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que orienta la respuesta al sida incluye intervenciones transformadoras en materia de género*, entre ellas intervenciones dirigidas a abordar las

intersecciones que se producen entre violencia de género y VIH?: Sí

149.4 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que orienta la respuesta frente al sida incluye secciones presupuestarias dedicadas a la implementación de intervenciones transformadoras en materia de género*?: Sí

Monitoreo y evaluación

150. ¿Cuenta su país con un plan o estrategia de monitoreo y evaluación para el VIH?: Sí, el monitoreo y la evaluación sobre VIH están integrados en una estrategia o plan de monitoreo y evaluación más amplios

Otro, especificar:

150.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha actualizado en los dos últimos años?: Sí

150.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿integra indicadores sensibles a las cuestiones de género*?: Sí

151. ¿Recopila su país de forma rutinaria datos sobre prestación de servicios para el VIH que están institucionalizados en un sistema de información?: Existe un sistema de información o un conjunto de sistemas de información complementarios armonizado del sector público que incluye indicadores específicos sobre prestación de servicios sobre el VIH para reporte a nivel nacional

152. ¿Cuenta su país con métodos para deduplicar datos clave como son los relativos a personas que son diagnosticadas con el VIH o personas que buscan terapias antirretrovirales (es decir, identificadores únicos)?: Sí

153. ¿Lleva a cabo su país actuaciones de vigilancia centinela en las siguientes poblaciones especiales?

	Vigilancia centinela realizada	¿Con qué frecuencia se realiza? (en años)	¿En qué año se realizó la encuesta más reciente?	En que número de centros se realizó la vigilancia?
IND_COLUMN_ANC_ATTENDEES	Yes	5	2016	44
IND_COLUMN_SW	No			
IND_COLUMN_MSM	Yes	5	2013	
IND_COLUMN_PWID	No			
IND_COLUMN_TG_PEOPLE	Yes	5	2013	
IND_COLUMN_IN_PRISON	Yes	1	2014	
IND_COLUMN_OTHER	No			

154. ¿Se ha realizado una evaluación nacionalmente representativa de la calidad de los datos durante el periodo del que se informa que ofrezca información sobre la precisión de los datos a nivel de centros sanitarios sobre el número de personas reportadas que están recibiendo terapia antirretroviral?: Sí

Part B debe ser cumplimentado por la sociedad civil y otros socios no gubernamentales

B.1 Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

1. ¿En su país se para o implementa alguna forma de pruebas de VIH obligatorias?: Sí

Si; favor incluir una breve explicación de en qué casos se llevan a cabo prácticas de pruebas obligatorias sobre VIH y los grupos afectados: Es un requisito para acceder a empleos en el Ministerio de Defensa y algunas empresas privadas y cuando se produce una donación de órganos a otra persona. Dos organizaciones indicaron que también es un requisito para afiliarse en algunas instituciones de salud privadas (IAMC) Para las/los trabajadoras/es sexuales resulta obligatorio el diagnóstico de infección por VIH para el ingreso al Registro Nacional del Trabajo Sexual además de controles trimestrales, tal y como se indica en las Directrices para la

Atención Integral de las/los trabajadoras/es sexuales, reglamentando la Ley N° 17.515 de Trabajo Sexual.” En el caso de las embarazadas, si bien las normas establecen la obligatoriedad de ofrecer pruebas de VIH a mujeres embarazadas lo que requiere el consentimiento informado verbal (no firmado), no hay una adecuada supervisión del cumplimiento de la norma por parte del personal médico, quienes muchas veces solicitan la prueba en el contexto de la rutina obstétrica sin información

2. ¿En qué lugares están disponibles en su país pruebas de carga viral?: Están disponibles en centros sanitarios que proveen terapias antirretrovirales, ya sea in situ o mediante remisión médica

De ser otra, sírvase indicarla:

3. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en su país (seleccionar todas las opciones que correspondan): Intervenciones de base comunitarias, Asociaciones de adherencia terapéutica y apoyo entre pares

De ser otra, sírvase indicarla: Si bien no existen disposiciones legales, si es de destacar distintas actuaciones que se han implementado para mejorar la retención terapéutica se pueden mencionar además de las anteriores, el desarrollo de instancias de capacitación y sensibilización en relación a la continuidad de la atención y promoción de la mejora a la adherencia al fármaco de las personas con VIH, dirigidas al personal de salud a nivel nacional. También corresponde mencionar la descentralización de algunos servicios de atención por parte de distintos organismos públicos, así como la implementación por parte de algunos prestadores de salud, de Equipos interdisciplinarios que brindan apoyo bio-psico social. Por otra parte, también ha habido una incorporación de nuevos fármacos.

4. ¿Se ha implementado alguna de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Consejería de pares, Mensajes de texto, Otro

De ser otra, sírvase indicarla: Se han implementado grupos de apoyo. Es de destacar que muchas de las opciones implementadas han sido fruto de iniciativas de la sociedad civil 2.. la vez

B.2 Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018

5. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están proveyendo servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH?: 44

6. ¿Cuántas instalaciones sanitarias que proveen servicios PTMI tienen en vigor mecanismos de rendición de cuentas comunitaria*?: 0

7. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los últimos doce meses?: Sí

7.1 Si la respuesta es afirmativa:

a) ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de revisión nacional?: Sí

b) ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil de ofrecer sus comentarios?: Sí

c) ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática?: No

d) ¿Esos análisis provistos por las comunidades y la sociedad civil se documentó y difundió tras esa reunión?: No

8. ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relativas a PTMI?: No

9. En el contexto de los programas sobre PTMI en su país, ¿existen informes o documentación sobre alguna de las siguientes prácticas? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Pruebas o tratamiento obligatorios o coercitivos sobre VIH, No aplicación del consentimiento informado voluntario obtenido de forma previa, Falta de confidencialidad y de privacidad, Otras violaciones de los derechos humanos* graves y sistemáticas

Otras violaciones de los derechos humanos* graves y sistemáticas (favor describirlas): Existe la participación en espacios de diálogo con el Estado, pero la elaboración final de estos productos recae sobre las autoridades. En el caso de las embarazadas, si bien las normas establecen la obligatoriedad de ofrecer pruebas de VIH, en ocasiones se les adjunta con otros exámenes sin requerir consentimiento. Para las/los trabajadoras/es sexuales resulta obligatorio el diagnóstico de infección por VIH para el ingreso al Registro Nacional del Trabajo Sexual además de controles trimestrales. Ley N° 17.515 Trabajo Sexual." Si bien existe normativa que exige el consentimiento informado previo, no existen mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento de tal normativa en todos los casos. Si bien existe normativa que exige la confidencialidad ante los motivos de consulta y frente al resultado de exámenes, la percepción de integrantes de los servicios, como de otros actores de la sociedad civil es que no siempre está asegurada

9.1 Si existen informes sobre alguna de tales situaciones que se den en su país, ¿está llevando a cabo su gobierno actuaciones de diligencia debida para darles respuesta?: No

B.3 Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y los presos)

Actuaciones de aplicación de la ley

10. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas/jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país?: No

11. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas transgénero que hayan sido arrestadas o perseguidas legalmente por su identidad de género?: No

12. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido arrestadas o perseguidas legalmente en relación con la venta de sexo?: No

13. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido arrestadas o perseguidas legalmente por actos homosexuales consentidos?: No

14. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido arrestadas o perseguidas legalmente por consumir drogas?: No

Protecciones legales para grupos de población clave

15. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para las personas transgénero (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Prohibiciones de la discriminación laboral basada en la diversidad de género

16. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para los profesionales del sexo (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Prohibición constitucional de la discriminación basada en el trabajo que se ejerza, El trabajo sexual está reconocido como trabajo, Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia al trabajo sexual

17. ¿Tiene su país legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a la orientación sexual de las personas? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Prohibición constitucional de la discriminación basada en la orientación sexual, Están prohibidos los actos de incitación al odio basados en la orientación sexual de las personas, Prohibición de la discriminación laboral basada en la orientación sexual de las personas, Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación sexual de las personas

18. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación* u otras disposiciones que correspondan a las personas que consumen drogas?: No

Servicios de prevención del VIH para las personas que usan drogas inyectables

19. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas?: No, pero agujas y jeringuillas pueden adquirirse legalmente en farmacias, sin necesidad de prescripción médica

20. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria?: No

21. ¿Hay operativos en su país programas de terapia de sustitución de opiáceos?: No

Servicios de prevención del VIH en las prisiones

22. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las prisiones?: No

23. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las prisiones?: No

24. ¿Los preservativos y lubricantes están disponibles a los presos en su país?: Sí

25. ¿Está disponibles en su país terapias antirretroviral para todos los presos que viven con el VIH?: Sí

26. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones

a) Con el consentimiento informado de los presos?: Sí

b) gratuitas?: Sí

c) Confidenciales: Sí

d) Disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad?: Sí

e) se acompañan de información relevante y accesible?: No

f) se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de las pruebas?: Sí

g) son accesibles por igual para todos los presos?: Sí

Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no cuentan con acceso igualitario? Por favor, especificar: La normativa indica que las pruebas de VIH se haga en forma confidencial, podría ocurrir que en algún caso las mismas no se realicen bajo esas condiciones. Se ha trabajado en la elaboración de protocolos que establecen el asesoramiento confidencial a las personas, no obstante lo cual, no existen mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento en todos los casos de estos protocolos

Participación

27. ¿Participan* los hombres que tienen relaciones sexuales en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: No

28. ¿Participan* los profesionales del sexo en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?:

29. ¿Participan* las personas que usan drogas inyectables en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: No

30. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas su salud en su país?: No

31. ¿Participan* los ex-presos y la población actualmente reclusa en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: No

Profilaxis previa a la exposición (PrEP)

32. ¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país?: Sí

32.1 Si la profilaxis previa a la exposición está disponible en su país, ¿esa profilaxis se ofrece...? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Disponible a través de proveedores privados

B.4 Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020

33. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones en su país en relación con violencia doméstica*? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Mandamientos judiciales para la protección de la seguridad de las supervivientes, Servicios de protección para supervivientes de actos de violencia doméstica, como son servicios legales o refugios, Servicios dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia

34. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH de la violencia? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Leyes penales generales que prohíben actos de violencia, Disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el estado serológico o por su pertenencia a grupos de población clave, Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas íntimas*

35. ¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que ofrezca los siguientes servicios de atención médica y psicológica para mujeres y hombres que hayan sido violados o sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la OMS 2013 Dar respuesta a la violencia ejercida por parejas íntimas y la violencia sexual contra la mujer:

a) Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos: Sí

b) Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan estos servicios durante los cinco días siguientes: Sí

c) Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de conformidad con la legislación nacional al respect: Sí

d) Profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH (dentro de las 72 horas siguientes a la agresión sexual), según sea necesaria: Sí

¿Tiene su país políticas de actuación en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual,

religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico, u otra condición de salud, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad, o cualquier otra situación?: Sí, esas políticas existen y se implementan de forma sistemática

B.5 Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año

37. ¿Participan* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí

37.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional al sida?: Autoridad coordinadora nacional sobre el sida u equivalente, con un mandato multisectorial amplio, Espacios de coordinación de la sociedad civil para grupos de población afectados por el VIH

De ser otra, sírvase indicarla:

B.6 Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

38. Alguno de los siguientes obstáculos limitan el acceso a programas de protección social* en su país? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Falta de información disponible sobre los programas, Procedimientos complicados, Miedo al estigma y la discriminación

De ser otra, sírvase indicarla:

B.7 Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

39. ¿Impone su país restricciones al registro o constitución y operación de organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria que afecten a la prestación o ejecución de servicios para el VIH?: Otro

De ser otra, sírvase indicarla: El país no impone restricciones, pero desde la sociedad civil se hace notar que existe ausencia o disminución del apoyo a las OSC, así como una reducción en el financiamiento para servicios de VIH

40. ¿Hay presentes en su país otros obstáculos normativos para la prestación de servicios dirigida de forma comunitaria?: Otro

Criterios de elegibilidad excesivamente restringidos para la prestación comunitaria de servicios (favor describir):

Otros: (favor describir): Si bien se permite la prestación de algunos servicios en forma comunitaria (grupos de apoyo, consejería entre pares, etc), hay una restricción cuando se refiere a servicios sanitarios, los cuales pueden prestarse exclusivamente en instalaciones sanitarias habilitadas.

41. ¿Tiene su país legislación, políticas o regulaciones que obstaculicen el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias?: Falta de mecanismos de contratación social y otros mecanismos que contemplan la financiación de la prestación de servicios dirigidos por las comunidades a través de financiamiento doméstico, Cuestiones relativas a "agentes extranjeros" u otras restricciones para el

acceso a financiación procedente de donantes internacionales

Otros: (favor describir):

B.9 Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

Alfabetización sobre derechos

42. En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?: Sí, a pequeña escala

43. ¿Existe algunos de los obstáculos siguientes para proveer la formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Falta de voluntad política, Falta de financiación

Mecanismos de rendición de cuentas

44. ¿Hay en su país mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave)?: Sí

Sí. Favor describir esos mecanismos: Existen organismos donde se pueden denunciar, registrar y dar respuesta a los casos de discriminación relacionada con el VIH, entre ellos la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), el MSP, la Conasida y la justicia competente. No obstante lo cual se señala desde la sociedad civil que en muchas ocasiones la gestión de dichas denuncias es compleja y lenta.

45. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario?: Procedimientos de reclamación

46. ¿Presenta su país algunos de los obstáculos siguientes para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Los mecanismos establecidos no funcionan, Limitaciones en cuanto a asequibilidad económica para grupos marginados o afectados, El conocimiento o nivel de concienciación sobre cómo utilizar tales mecanismos son limitados

47. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a la justicia (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Sí, servicios legales provistos por centros jurídicos universitarios, Sí, servicios paralegales comunitarios

Sí, otros: favor describir:

48. ¿Existen en su país obstáculos documentados para el acceso a la justicia por parte de grupos de población clave, personas que viven con el VIH u otras personas afectadas por el VIH?: No

Sí. Favor describir y brindar detalles sobre su alcance:

0 Encabezado

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Encuesta sobre el uso de ARV

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Nombre de persona que rellenó el cuestionario: Susana Cabrera

Cargo: Responsable Área Programática ITS-VIH/Sida

Institución: Ministerio de Salud Pública

Dirección de correo electrónico: susanacabrera1@gmail.com scabrera@msp.gub.uy

Teléfono: 598 99685313

1A Visión general del tratamiento antirretrovírico (extraída de GAM 1.2, no es necesario rellenarla)

1B Tratamiento antirretroviral (tar) de adultos y adolescentes (≥ 10 años) vih positivos, incluyendo embarazadas

Pregunta 1. Informe sobre el número de pacientes adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos que recibían tratamiento de primera, segunda o tercera línea a fines de diciembre del 2016

	Número total de adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos por línea de tratamiento a fines de diciembre del 2016
Primera línea	4971
Segunda línea	1162
Tercera línea	128
TOTAL	6261

Pregunta 2 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de primera línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2016, incluyendo embarazadas VIH positivas que reciben TAR.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.

Lista de esquemas de TAR de 1a línea administrados a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2016	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema de TAR a fines del 2016
1. AZT/3TC + EFV	1600
2. TDF/FTC (o + 3TC) + EFV	1241
3. AZT/3TC + NVP	779
4. AZT/3TC + LPV/r	529
5. ABC/3TC + EFV	203
6. TDF/FTC (o + 3TC) + NVP	201
7. TDF/FTC (o + 3TC) + LPV/r	207
8. ABC/3TC + LPV/r	71
9. AZT/3TC + ATV/r	67
10. TDF/FTC (o + 3TC) + DGV	57
11. TDF/3TC (o + 3TC) + ATV/r	42
12. ABC/3TC/ABC	28
13. ABC/3TC + ATV/r	25
14. ABC/3TC/DGV	10
15. 3TC/LPVr	9
16. TDF/FTC (o + 3TC) + DRV/r	3
17. AZT/3TC + LPV/r + RAL	7
17. AZT/3TC + LPV/r + RAL	7

Pregunta 3 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2016.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.

Lista de Tesquemas de TAR de 2a línea administrados a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2016	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2016
AZT/3TC + LPV/r	307
TDF/FTC + LPV/r	290
ABC/3TC + LPV/r	138
TDF/FTC + ATV/r	129
AZT/3TC + SQV/r	58
AZT/3TC/ATV/r	48
TDF/FTC + EFV + LPV/r	29
TDF/FTC + DRV/r	18
TDF/FTC + EFV + DRV/r	13
ABC/3TC + SQV/r	13
TDF/FTC + SQV/r	13
AZT/3TC + TDF + LPV/r	11
3TC + EFV + LPV/r	10
ABC/3TC/DGV	10
TDF/FTC + DGV	10
Otros	65

Pregunta 4 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 3a línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2016.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016

Lista de esquemas de TAR de 3.a línea administrados adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2016	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2016
TDF/FTC + DRV/r	33
TDF/FTC + RAL + DRV/r	20
AZT/3TC + RAL + DRV/r	10
TDF/FTC + ETR + DRV/r	7
T20 + RAL + DRV/r	5
TDF/FTC + RAL + ETR + DRV/r	5
3TC + EFV + DRV/r	5
RAL + ETR + DRV/r	5
3TC + EFV + LPV/r	4
3TC + ETR + LPV/r	4
TDF/FTC + RAL + LPV/r	3
ABC + 3TC + DRV/r	3
AZT/3TC + EFV + LPV/r	3
AZT/3TC + NVP + DRV/r	3
Otros: Regímenes con < 3 pacientes	18

2 Tratamiento de niños vih positivos (<10 años)

Pregunta 5. Número de niños VIH positivos menores de 10 años por línea de tratamiento antirretrovirales a fines del 2016

	Número total de niños <10 años VIH positivos que recibían este esquema a fines de 2016
Primera línea	56
Segunda línea	29
Tercera línea	15
TOTAL	100

Pregunta 6. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 1.a línea administrado a niños <10 años a fines del 2016.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.

Lista de esquemas de TAR de 1.a línea administrados a niños VIH positivos a fines del 2016	Número de niños < 3 años que recibían este esquema (A)	Número de niños ≥ 3 a <10 años que recibían este esquema (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema (A) + (B)
AZT/3TC + LPV/r	11	36	47
AZT/3TC + EFV	0	7	7
TDF/3TC (o FTC) + EFV	0	2	2

TOTAL

	Número de niños < 3 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A)	Número de niños ≥ 3 a <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A) + (B)
TOTAL	11	45	56

Pregunta 7. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2016.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.

Lista de esquemas de TAR de 2.a línea administrados a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2016.	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2016
AZT/3TC + LPV/r	17
AZT/3TC + EFV	5
AZT/3TC/ABC + LPV/r	3
TDF/FTC + EFV	1
ABC/EFV/LPV/r	1
ABC/3TC + EFV	1
AZT/3TC/ABC + EFV	1

Pregunta 8 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de tercera línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2016.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.

Lista de esquemas de TAR de tercera línea administrados a niños VIH positivos < 10 años	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2016
AZT/3TC + LPV/r	7
TDF/3TC (o FTC) + LPV/r	3
TDF/FTC (o 3TC) + DGV	2
TDF/FTC (o 3TC) + EFV + DRV/r	2
AZT/3TC + DRV/r	1

3 Prevención de la transmisión maternoinfantil

Pregunta 9: Número y porcentaje (%) de embarazadas que iniciaron tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil y otras opciones de PTMI durante el 2016 {GAM 2.3}

Pregunta 10: ¿Cuál es la opción de PTMI recomendada en su país para embarazadas VIH positivas :: Opción B+ (o "TREAT ALL")

Si Otra opción de PTMI utilizada en su país, especifique:

Pregunta 11. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN A de PTMI en el 2016.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016

Esquemas de PTMI de la OPCIÓN A utilizados para embarazadas VIH positivas en el 2016	Número de embarazadas VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2016
TOTAL	Valor de datos

Pregunta 12. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN B de PTMI en el 2016.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016

Esquemas de TAR usados para la OPCIÓN B en embarazadas VIH positivas	Número de embarazadas VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2016
	Valor de datos
TOTAL	

Pregunta 13. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN B+ de PTMI en el 2016.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.

Esquemas de TAR usados para OPCIÓN B+ en embarazadas VIH positivas	Número de embarazadas con VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2016
AZT/3TC + LPV/r	77
TDF/3TC (o FTC) + LPV/r	8
AZT/3TC + EFV	8
AZT/3TC + LPV/r + RAL	7
TDF/3TC (FTC) + EFV	5
ABC/3TC + LPV/r	3
	Valor de datos
TOTAL	108

Pregunta 14. Por favor liste el numero de neonatos por cada ARV utilizado en su país para la profilaxis del VIH en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas en el 2016.

Antirretrovirales utilizados para la profilaxis en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas ARV en 2016	Número de neonatos que recibieron este esquema en el 2016
AZT	95
AZT + NVP	17
	Valor de datos
TOTAL	112

4 Servicios de laboratorio

PRUEBAS DE VIH

	Valor de datos
Pregunta 15. Número total de pruebas de VIH (pruebas rápidas y ELISA) realizadas entre enero y diciembre del 2016: : (Número de personas a las que se realizó la prueba del VIH: Ver GAM 1.1)	

PRUEBAS DE CD4

	Valor de datos
Pregunta 16. Número total de pruebas de CD4 realizadas entre enero y diciembre del 2016:	
Pregunta 17. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2016:	
Pregunta 18. Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2016:	11206
Pregunta 19. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2016:	108

CARGA VIRAL

	Valor de datos
Pregunta 20. Número total de pruebas de carga viral realizadas entre enero y diciembre del 2016:	
Pregunta 21. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2016:	
Pregunta 22. Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2016:	12048
Pregunta 23. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2016:	108

DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN NIÑOS MENORES DE 12 MESES

	Valor de datos
Pregunta 24. Número total de pruebas de diagnóstico temprano realizadas entre enero y diciembre del 2016:	350
Pregunta 25. Número de niños (<12 meses) nacidos de madres VIH positivas a quienes se les realizó una prueba de diagnóstico temprano entre enero y diciembre del 2016:	112

Pregunta 26: Número total de laboratorios o establecimientos de salud y tipo de pruebas

Tipo de pruebas de laboratorio

	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde se recogen muestras	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba y que participan en un programa de evaluación externa de la calidad	Número de laboratorios o establecimientos de salud que requieren actividades de mejora de la calidad en base al ejercicio de evaluación externa de la calidad	Enumere las principales actividades necesarias para mejorar la calidad
Prueba serológica de anticuerpos anti-VIH incluida la prueba rápida	200	150			
Diagnóstico temprano en niños (menores de 12 meses) (EID)	44	6			
CD4	44	10			
Carga viral	44	10			
Pruebas de genotipificación y farmacorresistencia del VIH	44	1			
GeneXpert (prueba de tuberculosis)	44	1			

Pregunta 27: Disponibilidad de tecnologías de laboratorio para el VIH: por favor, enumerar tantas tecnologías como posea su país a fines del 2016. Elimine aquellas que su país no posea.

Tipo de máquina

	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Otra razón	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2016
Tecnologías para pruebas de CD4											
Alere Pima Analyzer											
Apogee Auto40 Flow Cytometer											
BD FACSCalibur											
BD FACSCount											
BD FACSPresto™ Near Patient CD4 Counter											
Coulter Epics											
Millipore-Guava											
Partec CyFlow											
Partec miniPOC											
PointCare NOW											

Otros

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Otra razón	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2016
-----------------	----------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--

Si hay equipos que no están en uso por otras razones, especifique las razones y el número de equipos:

Tipo de máquina

	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Otra razón	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2016
Tecnologías para pruebas de carga viral											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) / manual/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) / m24/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) / m2000sp/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 Qualitative assay (B) / manual/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 Qualitative assay (B) / m2000sp/m2000rt											
COBAS® AMPLICOR HIV-1 MONITOR Test (A) / Amplicor (Roche)											
Roche Amplicor HIV-1 DNA test (B) / Amplicor											
COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS TaqMan 48 (Roche)											
COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS TaqMan 96 (Roche)											
COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative (B) / COBAS TaqMan 48 (Roche)											
COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative (B) / COBAS TaqMan 96 (Roche)											
GENERIC HIV CHARGE VIRALE (A) / one NorDiag Arrow instrument											
GENERIC HIV CHARGE VIRALE (A) / two NorDiag Arrow instruments											
NuclISenseEasyQ® HIV-1 (A) / NuclISens miniMAG / EasyQ® (bioMerieux)											
NuclISenseEasyQ® HIV-1 (A) / NuclISens easyMAG / EasyQ® (bioMerieux)											

VERSANT® HIV-1 RNA 1.0 Assay (kPCR) (A) / VERSANT® kPCR Molecular System (Siemens)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(A) - Ensayos utilizadas para medir niveles de ARN del VIH-1 (carga viral)

(B) - Ensayos utilizados para la detección cualitativa de ARN y AND del VIH-1 en adultos y niños (inclusive menores de 18 meses de edad).

Otras tecnologías virológicas

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Otra razón	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2016
-----------------	----------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--

Si hay equipos que no están en uso por otras razones, especifique las razones y el número de equipos:

5 Metas del país con fines de proyección

Pregunta 28. En el cuadro siguiente, informe sobre las metas nacionales para los próximos cinco (5) años en materia de tratamiento antirretroviral, prevención de la transmisión maternoinfantil de la infección por el VIH y pruebas de laboratorio.

Meta del país

	A fines del 2017	A fines del 2018	A fines del 2019	A fines del 2020	A fines del 2021	A fines del 2022
1. Número de adultos y niños que reciben TAR	7000	7400	7800	8300	8800	9300
1.1 Número de adultos y adolescentes ≥10 años que reciben TAR						
1.2 Número de niños <10 años que reciben TAR						
1.2.1 Número de niños <5 años que reciben TAR						
1.2.2 Número de niños de 5 a <10 años que reciben TAR						
2. Número total de embarazadas que iniciaron TAR para la PTMI del VIH						
2.1 Número de embarazadas en Opción B+						
2.2 Número de embarazadas en Opción B						
2.3 Número de embarazadas en Opción A						
3. Número total de personas a las que se le realizará la prueba del VIH						
4. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de CD4						
5. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de carga viral						
6. Número total de niños nacidos de madres VIH positivas a los que se les realizará la prueba de diagnóstico temprano						
7. Número total de pruebas serológicas del HIV						
8. Número de pruebas de CD4						
9. Número de pruebas de carga viral						
10. Número de pruebas de diagnóstico temprano en niños menores de 12 meses						

Pregunta 29: En el cuadro siguiente, informar los esquemas de tratamiento con antirretrovirales para los siguientes tres años.

Adultos

Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2017	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019
---------	---	---	---

Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2017	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019
---------	---	---	---

Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2017	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019
---------	---	---	---

Pregunta 30: Si el esquema de la prevención de la transmisión materno-infantil de la infección por el VIH no está incluida en el cuadro anterior, por favor, liste los esquemas y el número de personas para el 2017-2019.

Esquema antirretroviral para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH	Número de personas con esquema antirretroviral - 2017	Número de personas con esquema antirretroviral - 2018	Número de personas con esquema antirretroviral - 2019
---	---	---	---

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2017	Número de personas con esquema antirretroviral - 2018	Número de personas con esquema antirretroviral - 2019
Total			

Pregunta 31. En el cuadro siguiente por favor informar de los esquemas para los siguientes tres años de tratamiento antirretroviral en niños.

Tratamiento antirretroviral en niños

Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2017	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019
---------	---	---	---

Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2017	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019
---------	---	---	---

Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2017	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019
---------	---	---	---

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2017	Número de personas con esquema antirretroviral - 2018	Número de personas con esquema antirretroviral - 2019
Total			

Question 32. En el cuadro siguiente informar sobre el pronóstico nacional en los tres años siguientes, prueba de Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test), CD4, carga viral y diagnóstico temprano infantil.

Número de pruebas realizadas en el 2016 y previstas para los próximos 3 años

	Pruebas realizadas en 2016	Pruebas previstas para 2017	Pruebas previstas para 2018	Pruebas previstas para 2019
Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test)				
CD4 test				
Carga viral				
Diagnóstico temprano infantil de VIH				

Pregunta 33. Por favor informe de las cantidades del tratamiento antirretroviral obtenido en el 2016, reportado en este [cuestionario](#).