



Recomendaciones para el posoperatorio

Al trasladar el animal a tu casa recuerda que está anestesiado, por lo que debes tener especial cuidado con su cuello y su cabeza para no dañarlo.

Abriga tu mascota hasta que esté bien despierta y mantenla en un ambiente cálido durante las primeras 24 horas.

Ocho horas después de la cirugía hay que administrarle una novemina en comprimido disuelta en una cucharadita de agua o dentro de un pequeño trozo de carne: es una cada 20 kilogramos de peso aproximadamente. Se puede repetir cada 8 horas durante los primeros dos días.

No lo alimentes hasta la mañana siguiente a la cirugía.

Evita que se lama la herida. Para evitarlo debe colocarse un collar isabelino.

No coloques nada sobre la herida.

Las suturas son reabsorbibles, no es necesario que saques los puntos.

Tener en cuenta que la herida suele inflamarse a los dos días de realizada la cirugía. Es normal, no te alarmes.

Si tu perra estaba en celo al momento de castrarla, por unos días seguirá atrayendo machos; debes evitar que se le acerquen, podrían montarla y lastimarla. Te recomendamos que siga con antibióticos (amoxicilina, cefradina o enrofloxacina) por una semana: comprarlos en una veterinaria y pedir las indicaciones al veterinario, al igual que si se le abre la herida.

Si presenta vómitos, ayudarlo a evacuar para que no lo aspire y se asfixie.



Intendencia de Maldonado
CONSTRUYENDO FUTURO

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Gracias por haber castrado a tu mascota y mantener una tenencia responsable.